

2. 一年生；上部叶舌长约5毫米；小穗长3—4毫米；花药长约0.4毫米……………

…………… 2. 银鳞茅 *B. minor* L.

1. 凌风草 (马君武：植物学) 图版 13: 1—4

Briza media L. Sp. Pl. 70. 1753; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 7: 336. 1897; Hekp. in Kom. Fl. URSS 2: 357, Pl. 137. f. 12. 1934; Bor, Grass. Ceyl. Ind. Pakist. 564. 1960; Tzvel. in Fed. Poac. URSS 522. 1976; 中国主要植物图说·禾本科 234, 图 187. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 56, 图 6942. 1976; 西藏植物志 5: 130, 图 66. 1987.

多年生，疏丛。秆直立或基部膝曲，高40—60厘米。叶鞘平滑，与叶片无明显的界限；叶舌薄膜质，先端截平，长0.5—1.5毫米；叶片扁平，边缘微粗糙，长达10厘米，宽约5毫米，顶生者短小。圆锥花序卵状金字塔形，开展，长8—10厘米，多两歧或三歧分叉；小穗柄细弱，长于小穗；小穗宽卵形，带紫色，长4—6毫米，宽5—7毫米，含4—8小花；颖片边缘膜质，顶端近圆形，第一颖具3脉，长2.5—3毫米，第二颖具3—5脉，长3—3.5毫米；外稃边缘膜质，具5脉，第一外稃长约4毫米；内稃倒卵形，稍短于外稃，背面无毛，脊具狭翼；花药长1.5—2毫米。花果期7—9月。染色体 $2n=14$ (Tateoka 1955), $14+25$, 28 (Poza Ho Ba 1940a)。


产西藏、四川。生于海拔3600—3800米的林间草地、山坡草甸。分布于尼泊尔、印度。

2. 银鳞茅 (锺观光拟) 图版 13: 5—11

Briza minor L. Sp. Pl. 70. 1753; Hekp. in Kom. Fl. URSS 2: 356, Pl. 27. f. 9. 1934; Bor, Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 528. 1960; Hsu in Taiwan 16: 239. 1971; Tzvel. in Fed. Poac. URSS 522. 1976; 中国主要植物图说·禾本科 234, 图 188. 1959; 台湾的禾草 307, 图 48. 1975; 中国高等植物图鉴 3: 56. 1976; 台湾植物志 5: 437, 图 1391. 1978.

一年生。秆直立，细弱，高20—30厘米。叶鞘质薄柔软，疏松裹茎，平滑；叶舌薄膜质，上部者先端尖，长约5毫米；叶片质薄，扁平，上面和边缘微粗糙，下面光滑，与叶鞘无明显界限，长4—12厘米，宽4—10毫米。圆锥花序开展，直立，长5—10厘米，分枝细弱，向上伸展，多两歧或三歧分叉；小穗柄细弱，稍糙涩，长约14毫米；小穗宽卵形，常淡绿色，长3—4毫米，含3—6小花，基部宽约4毫米；颖片较宽，长2—2.5毫米，具3—5脉，顶端近圆形；外稃具宽膜质边缘，背部平滑或被微毛，具7—9脉；第一外稃长约2毫米；内稃稍短于外稃，卵形，背面具小鳞毛；花药长约0.4毫米；颖果三角形。花果期夏季。染色体 $2n=10$ (Avdulov 1928, 1931), $2n=14$ (Gould 1958)。

原产欧洲。我国福建、台湾、江苏有引种栽培，浙江杭州有逸生。模式标本采自欧洲。



图版 13 1—4. 凌风草 *Briza media* L.: 1. 花序, 2. 小穗, 3. 小花侧面, 4. 小花腹面。5—11. 银鳞茅 *B. minor* L.: 5. 花序, 6. 小穗, 7. 小花侧面, 8. 小花腹面, 9. 内稃背面, 10. 内稃腹面, 11. 内稃背面的鳞毛。12—14. 鼠茅 *Vulpia myuros* (L.) Gmel.: 12. 花序, 13. 小穗, 14. 第一小花。15—17. 鸭茅 *Dactylis glomerata* L.: 15. 花序, 16. 小穗, 17. 第一小花。(刘进军绘)