

雄蕊 3, 花药长 2.75—3 毫米; 鳞被 2, 长约 1 毫米, 膜质, 具 1—2 齿。 花期 6—7 月。

产西藏南部。生于海拔 4500—5500 米的高山草地。分布于不丹。模式标本采自西藏错那。

### 15. 小沿沟草属\* *Catabrosella* (Tzvel.) Tzvel.

Tzvel. in Bot. Zhurn. **50** (9): 1320. 1965. — *Colpodium* Trin. sub-gen. *Catabrosella* Tzvel. in Nov. Syst. Pl. Vasc. **1964**: 12. 1964.

多年生草本。秆直立。叶鞘闭合达  $1/6$ — $1/4$ , 稀分裂几达基部, 光滑无毛; 叶片扁平或疏松纵卷。圆锥花序疏松开展, 稀紧缩; 小穗含 (1) 2—3 (4) 小花, 小穗轴光滑无毛, 在每个小花下具关节; 颖膜质, 卵圆形至披针形, 顶端钝或渐尖, 具 1—3 脉; 外稃草质, 约  $1/2$  以上为膜质, 具 3—5 脉, 沿脉的下部或所有表面被柔毛, 顶端钝或渐尖, 基盘短钝光滑; 内稃与外稃等长, 具 2 脊, 脊上被柔毛或光滑; 鳞被 2, 2 浅裂; 雄蕊 3。颖果与稃体分离或部分粘合。种脐椭圆形至长圆状线形。染色体大,  $x=5, 6, 9$ 。

属模式: 矮小沿沟草 *Catabrosella humilis* (Bieb.) Tzvel.

约 6 种, 主要分布于欧洲和亚洲温带地区。我国有 1 种。

#### 1. 矮小沿沟草 (拟) 图版 32: 1—4

*Catabrosella humilis* (Bieb.) Tzvel. in Bot. Zur. **50** (9): 1320. 1965. et in Pl. Asiae Centr. **4**: 148. 1968. et in Fed. Poac. URSS **480**. 1976; T. C. Tutin., Fl. Europ. **5**: 167. 1980. — *Aira humilis* Bieb. in Fl. Taur.-Cauc. **1**: 57. 1808. — *Catabrosa humilis* (Bieb.) Trin. in Fund. Agrost. **136**. 1820. — *Colpodium bulbosum* Trin. in Mem. Acad. Sci. Petersb. ser. 6, **1**: 394. 1830. nom. illeg. — *Poa humilis* (Bieb.) C. Koch in Linnaea. **21**: 406. 1848, non Lejeune, 1811. — *Colpodium humilie* (Bieb.) Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. **4**: 384. 1852; Nevski in Kom. Fl. URSS **2**: 442. 1934.

多年生, 密丛。秆直立或下部节处膝曲, 高 10—30 厘米, 径约 1 毫米, 具 2—3 节, 光滑, 基部被有老叶鞘, 并加粗呈鳞茎状。叶鞘闭合达长的  $1/6$ , 光滑, 边缘窄膜质; 叶舌膜质, 长 1—2 毫米; 叶片线形, 扁平或疏松纵卷, 长 1—6 厘米, 宽 1—2 毫米, 两面无毛, 边缘极粗糙。圆锥花序金字塔形, 疏松开展或稍紧缩, 长 3.5—7 厘米, 宽 2—5 厘米, 每节具 2—6 分枝; 分枝细, 光滑; 小穗淡褐色带紫色或绿色带紫色, 有光泽, 含 2—4 小花, 长 3—5 毫米; 小穗轴节间长 0.3—0.8 毫米, 无毛; 颖透明膜质,

\* 小沿沟草属 (拟)。