

- 7. 卵花甜茅 *G. tonglensis* C. B. Clarke
 9. 小穗狭窄, 线形, 长 11—14 毫米; 第一外稃长 4—4.5 毫米; 叶舌长 5—6 毫米.....
 8. 中华甜茅 *G. chinensis* Keng

组 1. 水甜茅组 Sect. *Hydropoa* Dum. in Observ. Gram. Belg. 126. 1823; 中国主要植物图说·禾本科 249. 1959; Tzvel. in Pl. Asiae Centr. 4: 149. 1968.

植株高大, 常超过 50 厘米。根茎长且粗壮。秆直立。圆锥花序大型, 多少开展, 具多数小穗; 小穗卵形或长圆形, 稍两侧压扁; 内稃两脊不具狭翼; 雄蕊 2—3。

组模式: *Glyceria maxima* (Hartm.) Holmb.

本组我国产 5 种。

1. 假鼠妇草 (钟观光拟)

Glyceria leptolepis Ohwi in Bot. Mag. Tokyo 45: 381. 1931. et in Acta Phytotax. et Geobot. 10: 130. 1941. et in Fl. Jap. 144. 1978; 中国主要植物图说·禾本科 249, 图 202. 1959; 东北植物检索表 468, 图版 172. 图 6. 1959; Hsu in Taiwaniana 16: 245. 1971. et 台湾的禾草 345. pl. 68. 1975; 中国高等植物图鉴 5: 51. 图 6931. 1976; 秦岭植物志 1 (1): 93, 图 74. 1976; 台湾植物志 5: 452. 1978; 内蒙古植物志 7: 60, 图版 23. 图 9—14. 1983. — *Glyceria aquatica* Honda in Monogr. Poac. Jap. 62. 1930. — *Glyceria formosensis* Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. 2: 164. 1933. — *Glyceria ussuriensis* Kom. in Fl. URSS 2: 460. 1934. — *Glyceria leptolepis* Ohwi var. *formosensis* (Ohwi) Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. 6: 151. 1937. — *Glyceria leptolepis* Ohwi var. *laxior* Keng in Sinensia 11: 40. 1940, syn. nov.

多年生, 有时具根茎。秆单生, 直立或基部斜倚, 坚硬, 高 80—110 厘米, 径 5—8 毫米, 具 13—16 节。叶鞘光滑无毛, 闭合几达鞘口, 具横脉, 长于或上部者稍短于节间; 叶舌质厚, 较硬, 长 0.3—1 毫米, 顶端圆形; 叶片质较厚而硬, 扁平或边缘内卷, 长达 30 厘米, 宽 5—10 毫米, 具横脉, 下面光滑, 上面与边缘粗糙。圆锥花序大型, 密集或疏松开展, 长 15—20 厘米, 每节具 2—3 分枝; 主枝粗壮, 长达 12 厘米, 上部粗糙, 基部光滑; 小穗卵形或长圆形, 绿色, 成熟后变黄褐色, 含 4—7 小花, 长 6—8 毫米, 宽 2—3 毫米; 颖透明膜质, 顶端钝圆或截平, 具 1 脉, 第一颖卵形, 长 1.5—2 毫米, 第二颖卵状长圆形, 长 2—2.5 毫米; 外稃草质, 顶端狭膜质, 尖或稍钝, 具 7 脉; 第一外稃长 3—3.5 毫米; 内稃等于或稍长于外稃, 顶端微凹, 脊上粗糙, 不具狭翼; 雄蕊 2, 花药长 0.6—0.7 毫米。颖果红棕色, 倒卵形, 长约 1.5 毫米。花果期 6—9 月, 染色体 $2n = 20$ (Sokolovskaya et Probatova 1973b)。

产东北、华北地区及陕西、甘肃、安徽、浙江、江西、台湾、河南。生于林下、湿草地、溪流或湖泊边缘、山坡、河岸浅水旁及水沟中。分布于俄罗斯远东、朝鲜及日本。模式标本采自日本。