

4c. 小颖短柄草 (变种) (禾本科图说)

var. **breviglume** Keng, 中国主要植物图说·禾本科 279. 1959; 西藏植物志 5: 152. 1987; 横断山区维管植物 2: 2205. 1994.

多年生。秆疏丛生或单生，高 50—80 厘米，具 6—7 节，紧接秆节下面有一圈倒生柔毛，节部被微毛。叶鞘短于节间，生短柔毛；叶舌长约 1 毫米，先端具纤毛；叶片长 6—12 厘米，宽 4—8 毫米，上面被短柔毛。穗形总状花序长 8—12 厘米，节及其下节间部分有微毛，大多俯垂；小穗柄长 1—2 毫米，生微毛；小穗长 15—25 毫米，含 7—10 小花；第一颖小，长 3—4 毫米，具 3—5 脉，先端圆钝，无毛，脊脉微粗糙，第二颖长 5—7 毫米，具 5—7 脉，脉稍粗糙；外稃长 9—11 毫米，具 7 脉，脉间有明显的横脉，无毛，芒细弱，长 5—12 毫米；内稃短于外稃 $1/5$ ，两脊上部具纤毛；顶端截圆；花药长 2 毫米。 花果期 9—10 月。

产西藏东部、四川、云南、贵州。生于山坡林下、灌丛草地，海拔 3100—4150 米。模式标本采自云南蒙自。

5. 基隆短柄草 (台湾的禾草)

Brachypodium kelungense (Honda) C. Hsu in Journ. Jap. Bot. 12: 153. 1936. — *Brachypodium sylvaticum* var. *kelungense* (Honda) C. Hsu in Taiwania 16: 236. 1971; 台湾的禾草 203, 图 41. 1975; 台湾植物志 5: 428. 1978.

多年生。秆高达 50 厘米，径约 1 毫米，多少坚硬，光滑，节明显，生有微毛。叶舌膜质，先端撕裂，长约 2 毫米；叶片长 10—12 厘米，宽 4—6 毫米。总状花序长约 10 厘米，具 10 枚小穗；小穗含 4—5 小花，长约 2 厘米；小穗轴具细毛，长约 1.5 毫米；第一颖长约 2.5 毫米，具 7 脉，先端具短芒；外稃近革质，长 7—8 毫米，有 7 脉，具短柔毛，先端具长约 7—8 毫米的芒；内稃与外稃等长，2 脊上生短纤毛。花药长 1.5—2 毫米。子房顶端有毛。

产台湾。生于海边与山地林缘和草地。分布于菲律宾。

6. 吕宋短柄草 (变种) (台湾的禾草)

Brachypodium luzoniense Hack. in Philippine Journ. Sci. 1: suppl. 4: 269. 1906. — *Brachypodium formosanum* Hayata in Gen. ind. 94. 1916. et in Icon. Pl. Form. 7: 93, f. 57. 1918. — *Brachypodium miserum* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo 39: 303. 1925. — *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) Beauv. var. *miserum* (Thunb.) Koidz. in Fl. Symb. Oc. As. 80. 1930. — *Brachypodium sylvaticum* var. *luzoniense* (Hack.) Hara in Bot. Mag. Tokyo 52: 227. 1938; Hsu in Taiwania 16: 236. 1971; 台湾植物志 5: 428. 1978.

多年生。秆高 50—80 厘米，节间长约 4 厘米。叶鞘长 5—6 厘米；叶舌长 2—3.5 毫米；叶片长约 15 厘米，宽 5—7 毫米，平滑无毛。穗状花序，小穗含 5—7 小花，长