

上具短纤毛,与外稃同时脱落;雄蕊3枚,花药紫色,长达1毫米。 花果期12月。

本种与鼠妇草 *Eragrostis atroviens* (Desf.) Trin. ex Steud. 相似,主要区别是圆锥花序开展,长8—25厘米,宽约15厘米。小穗长达2—2.5厘米,宽1—1.5毫米;小花数较多,达40朵。

产广东;生于庭园空旷地上。模式标本采自广州。

8. 垂穗画眉草(植物分类学报) 图版4:6—8,120:8

*Eragrostis fractus* S. C. Sun et H. Q. Wang in Acta Phytotax. Sin. 19(4): 513. f. 1:3. 1981.

多年生。根系发达,长约10厘米。秆丛生,基部压扁,膝曲,高约60厘米,径约2.5毫米,具2—3节,直立。叶鞘松散,通常比节间长,无毛,鞘口有少数毛;叶舌膜质,长约1毫米;叶片多卷缩,长8—16厘米,宽2—3毫米,上面疏生长毛。圆锥花序松散,长30—40厘米,分枝单一,纤细,分枝腋间无毛,着生稀疏小穗;小穗柄长1—2厘米,小穗长1—2厘米,宽约3毫米,含8—30小花;颖为披针形,第一颖长约2毫米,第二颖长约2.5毫米;外稃为广椭圆形,先端急尖或渐尖,长约2.5毫米;内稃稍短,成熟后与外稃同时脱落;小穗轴宿存。颖果椭圆形,果皮具纵纹,有白色短毛。 花期3月。

本种与 *Eragrostis longisipicula* S. C. Sun et H. Q. Wang 相似,其主要区别为:本种圆锥花序松散,纤细而柔软下垂,小穗稀疏,小穗柄长可达2厘米,有小花8—30朵,颖较大,第一颖长约2毫米,第二颖长约2.5毫米;外稃广椭圆形,先端急尖或渐尖。颖果有毛。

特产我国云南省建水县。模式标本采自建水县。

9. 佛欧里画眉草(台湾植物志)

*Eragrostis fauriei* Ohwi in Bot. Mag. Tokyo. 55:278. 1941; 台湾的禾草 401. 1975; 台湾植物志 5: 482. 1978.

多年生。秆高30—60厘米,密集丛生,直立,无毛;叶鞘比节间短;叶片革质,宽2—5毫米,边缘内卷,叶舌具纤毛。圆锥花序10—15厘米长,松散,分枝向上,粗糙,腋间无毛,小穗披针形,略紧缩,长5—10毫米,宽约2.5毫米,含6—15朵小花,上升或略紧贴,具花梗,淡灰色或稍带点紫色;颖宽披针形,渐尖,具1脉,第一颖长1—1.5毫米,第二颖长1.5—1.7毫米;外稃长约2毫米,卵圆形,急尖,具细点,脊明显粗糙;侧脉明显,近于平行,约为外稃的2/3;内稃宿存,脊为弧形,粗糙有毛。小穗轴宿存,稍压扁。雄蕊3,花药长圆形,黑紫色,长约0.5毫米。颖果椭圆形,稍扁压,纹细不明显,长约2/3毫米。

特产我国台湾省。模式标本采自新店。

本种似 *Eragrostis nutans* (Retz.) Nees, 它们是否为同一种植物,本文根据文献记载,有待见到标本后再作确定。

10. 弯叶画眉草(禾本科图说) 图版120:9,124:1