

10 厘米, 宽 3—5 毫米, 上面粗糙, 下面光滑, 无毛。圆锥花序开展, 分枝单一或簇生, 节间很短, 腋间有长柔毛, 小枝和小穗柄上具腺点; 小穗卵形至长圆状卵形, 长约 2 毫米, 含小花 4—10 朵, 成熟后, 小穗轴由上而下逐节断落; 颖膜质, 具 1 脉, 第一颖长约 0.8 毫米, 第二颖长约 1 毫米; 第一外稃长约 1 毫米, 有明显紧靠边缘的侧脉, 先端钝; 内稃脊上具有长纤毛; 雄蕊 3 枚, 花药长约 0.3 毫米。颖果长圆形, 深红色, 长约 0.5 毫米。花果期 4—8 月。染色体 $x = 10$ 。

产湖北、福建、台湾、广东、广西等省区; 生于田野或荫蔽之处。分布于东半球热带地区。模式标本采自印度。

牧草。全草入药可清热凉血。

28. 高画眉草(海南植物志) 图版 7:4—6, 123:3

Eragrostis alta Keng in Lingn. Sci. Journ. 16:1. 1937; Merr. et Chun in Sun-yatsenia 5:17. 1940; 海南植物志 4:374. 1977.


一年生。秆直立, 粗壮, 高 120—150 厘米, 径约 5 毫米, 具有条纹。叶鞘疏松裹茎, 无毛, 具有明显的条纹; 叶舌长约 1 毫米, 边缘具短纤毛; 叶片扁平, 长 20—45 厘米, 宽 3—5 毫米, 无毛, 下面粗糙, 色稍浅, 上面光滑。圆锥花序紧缩, 长 20—40 厘米, 宽约 3 厘米, 花序分枝单生或成对, 直立, 分枝腋间无毛, 小穗有 5—9 小花, 长 2—3 毫米, 宽 0.8—1 毫米; 小穗柄直立或弯曲, 小花在小穗轴上排列松散, 黄绿色, 无毛; 颖膜质, 近等长, 长约 0.7 毫米, 卵圆形, 具 1 脉, 先端钝; 第一外稃长约 1 毫米, 具 3 脉, 先端钝或稍急尖; 内稃脊间折合, 脊上无毛, 或略有短纤毛; 雄蕊 2 枚, 长约 0.4 毫米。未见到果。

特产海南; 生于林下潮湿沙土上。模式标本采自昌江。

29. 亂草(亚洲文会会报新 22 卷) 碎米知风草(植物学大辞典) 图版 123:4

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. in Mem. Acad. Sci. St. Petevsb., Ser. 6, 1:405. 1831; Hichc. in Lingn. Sci. Journ. 7:191. 1931; Bor, Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 509. 1960; 中国主要植物图说 禾本科 320. 图 261. 1959; 华东禾本科植物志 93. 1962; Hsu in Hara, Fl. E. Himalaya 361. 1966; 台湾的禾草 405. 图 98. 1975; 中国高等植物图鉴 5:131. 图 7091. 1976; 江苏植物志(上册): 181. 1977; 台湾植物志 5:484. 1978. — *Poa japonica* Thunb. Fl. Jap. 51. 1784. — *Eragrostis tenella* auct. non (L.) Beauv.: Ohwi in Bot. Mag. Tokyo 55:275. 1941.

一年生。秆直立或膝曲丛生, 高 30—100 厘米, 径 1.5—2.5 毫米, 具 3—4 节。叶鞘一般比节间长, 松裹茎, 无毛; 叶舌干膜质, 长约 0.5 毫米; 叶片平展, 长 3—25 厘米, 宽 3—5 毫米, 光滑无毛。圆锥花序长圆形, 长 6—15 厘米, 宽 1.5—6 厘米, 整个花序常超过植株一半以上, 分枝纤细, 簇生或轮生, 腋间无毛。小穗柄长 1—2 毫米; 小穗卵圆形, 长 1—2 毫米, 有 4—8 小花, 成熟后紫色, 自小穗轴由上而下的逐节断落; 颖近等长, 长约 0.8 毫米, 先端钝, 具 1 脉; 第一外稃长约 1 毫米, 广椭圆形, 先端钝, 具 3 脉, 侧脉明显; 内稃长约 0.8



部分花序放大

1. 纤毛画眉草 *Eragrostis ciliata* (Roxb.) Nees。 2. 钩鱼草
Eragrostis tenella (L.) Beauv. 3. 高画眉草 *Eragrostis alta* Keng.
 4. 乱草 *Eragrostis japonica* (Thunb.) Trin. 5. 纹稃草 *Harpachne*
harpachnoides (Hack.) Keng. 6. 羽穗草 *Desmostachya bipinnata*
 (L.) Stapf. 7. 细画眉草 *Eragrostiella lolioides* (Hand.-Mazz.) Keng
 f. 8. 尖稃草 *Acarachne racemosa* (Heyne ex Roem. et Schult.)
 Ohwi. (王徽勤摄)