

多年生草本。秆直立，细弱，具多节，高 30—75 厘米，径约 1 毫米。叶鞘长于节间，无毛，鞘口具白色长柔毛；叶舌具短纤毛；叶片线形，长 1.5—7 毫米，宽 1—2 毫米，上面粗糙，下面平滑，内卷成针状或披针形。圆锥花序开展，长 5—12 厘米，分枝单生，粗糙，常自基部具小枝与小穗，基部分枝长 3—8 厘米；小穗长 10—14 毫米，含 5—8 小花，黄绿色或带紫色；颖披针形，先端尖，近膜质，具 1 脉，第一颖长 2—4 毫米，第二颖长 3.5—5 毫米；外稃披针形，5 脉，第一外稃长约 5 毫米，先端具长 0.2 毫米的小尖头；内稃与外稃近等长。 花果期 7—9 月。

产陕西、宁夏等省区；生于海拔 1500 米的山坡草地。模式标本采自陕西武功。

3. 枝花隐子草 图版 12

Cleistogenes ramiflora Keng et C. P. Wang in Bull. Bot. Resear. 6(1): 175—177. 1986.

多年生草本。秆丛生，高 25—35 厘米，直立或基部稍倾斜。叶鞘除鞘口有长柔毛外，余均无毛；叶舌短，平截；叶片狭线形，扁平或内卷，长 3—10 厘米，宽约 2 毫米。圆锥花序狭窄，长 5—9 厘米，宽 2—5 厘米，基部分枝长 2—4 厘米；小穗长 7—9 毫米，含 3—4 小花；颖狭披针形，膜质，具 1 脉，第一颖长 2—4 毫米，第二颖长 4—5 毫米；外稃披针形，边缘及先端带紫色，第一外稃长 5—6(7) 毫米，5 脉，先端无芒或具长 0.5 毫米的短尖头；内稃稍短于外稃；花药带紫色，长约 3 毫米。 花果期 7—9 月。

本种近似细弱隐子草 *C. gracilis* Keng，唯其小穗仅含 3—4 小花，颖狭窄，第一外稃长 5—6(7) 毫米，以及其内稃较短于外稃等性状可以区别。

产内蒙古大青山；多生于山地草原及灌丛中。模式标本采自内蒙古大青山。

本种为优良牧草，各种家畜均喜采食。

4. 小尖隐子草(禾本科图说)

Cleistogenes mucronata Keng, 中国主要植物图说 禾本科 297. 图 241. 1959; nom. nud. ex Keng f. et L. Liou in Acta Bot. Sin. 9(1):70. 1960. — *Kengia mucronata* (Keng) Packer in Bot. Not. 113(3):293. 1960.

多年生草本。具短根头。秆丛生，高 15—45 厘米，径 0.5—1 毫米，平滑无毛，基部具密集枯叶鞘。叶鞘长于节间，鞘口具长柔毛；叶舌为一圈纤毛；叶片线形，长 1.5—6 厘米，宽 1—2 毫米，内卷，无毛，上面及边缘粗糙。圆锥花序开展，长 3—11 厘米，分枝单生，粗糙，自基部即着生小穗，基部分枝长 2—4 厘米；小穗长 (6)8—10 毫米，含 4—6 小花，黄褐色或上部带紫色；颖披针形，先端尖，第一颖长约 3 毫米，1 脉，第二颖长约 4 毫米，3 脉；外稃披针形，5 脉，第一外稃长 3—4.5 毫米，先端具长约 0.5 毫米的短尖头；内稃等长或稍短于外稃；花药黄色，长约 2 毫米。 花果期 7—9 月。

产甘肃、青海；生于山坡碎石中或山麓冲积地。模式标本采自甘肃。

5. 糙隐子草(禾本科图说) 图版 11:7—12