

var. **nakai** (Keng) Ohwi in Bot. Mag. Tokyo **55**:309. 1941; 中国主要植物图说禾本科 290. 1959; 华东禾本科植物志 86. 1962. — *Cleistogenes chinensis* var. *nakai* Keng in Sinensia **5**:151. 1934. — *C. nakai* (Keng) Honda in Rep. First. Sci. Exped. Mansh. **4**:61. 99. 1936. — *Kengia nakai* (Keng) Packer in Bot. Not. **113**(3):291. 1960.

与原变种的区别为：小穗灰绿色，长 7—9 毫米，含 2—5 小花；颖近膜质，具 1 脉或第一颖无脉，第一颖长 0.5—2 毫米，第二颖长 1—3 毫米；外稃披针形，黄绿色，常具灰褐色斑纹，外稃边缘及基盘均具短柔毛，第一外稃长 5—6 毫米，先端芒长 3—9 毫米。花果期 7—10 月。

产辽宁、内蒙古、甘肃、河北、山西、山东、河南、陕西、江苏、湖北等省区；多生于山坡林缘、林下灌丛。模式标本采自朝鲜济州岛。

本变种植株较高大，根系发达，秆直立，叶量丰富，具有绿化山林及防止水土流失的作用，亦为优良的饲用植物，可试引种栽培。

9. 双稃草属*——*Diplachne* Beauv.

Beauv. Ess. Agrost. 80. t. 16. f. 9. 1812.

一年生或多年生草本。圆锥花序由多数总状花序所组成；小穗两侧压扁，含数小花，具短柄，成 2 行排列于穗轴之一侧，脱节于颖之上及各小花之间；颖不等长，具 1 脉，顶端锐尖；外稃具 1—3 脉，顶端有 2—4 齿，中脉隆起成脊且延伸成小尖头或短芒；雄蕊 3；花柱分离。

模式种：束序双稃草(拟) *D. fascicularis* (Lam.) Beauv. (*Festuca fascicularis* Lam.) 产南美。

本属约 14 种，多分布于全世界的热带及温暖地区；我国仅有 1 种。

1. 双稃草(禾本科图说) 图版 16: 1—6

***Diplachne fusca* (L.) Beauv.** Ess. Agrost. 80, 163. 1812; 中国主要植物图说禾本科 453. 图 385. 1959; 台湾的禾草 385. 图 88. 1975; 中国高等植物图鉴 **5**:137. 图 7103. 1976; 江苏植物志 (上册): 191. 图 318. 1977; 海南植物志 **4**:381. 1977. — *Festuca fusca* L. Sp. Pl. ed. 2, 109. 1762. — *Leptochloa fusca* (L.) Kunth, Rev. Gram. **1**:91. 1829. — *Diplachne malabarica* (L.) Merr. in Bull. Torrey Club **60**:635. 1933; Merr. et Chun, in Sunyatsenia **5**:15. 1940. — *Poa malabarica* L. Sp. Pl. 69. 1753, p. p. (Habitat in Indiae arenosis, Rheede's Plate).

多年生；秆直立或膝曲上升，有或无分枝，高 20—90 厘米，无毛。叶鞘平滑无毛，疏松

* 双稃草属见耿以礼等(1957)：中国主要禾本科植物属种检索表。