

等省区;多生于田野路边和园圃内。分布于全球的热带和亚热带地区。模式标本采自印度。

本种草质柔软,为优良牧草。

11. 草沙蚕属*——*Tripogon* Roem. et Schult.

Roem. et Schult. Syst. Veg. 2: 34. 1817.

多年生细弱草本,密丛。叶片细长,通常内卷。穗状花序单独顶生;小穗含少数至多数小花,几无柄,成2行排列于纤细穗轴之一侧,小穗轴脱节于颖之上及各小花之间;颖具1脉,不等长,第一颖较小,通常紧贴穗轴之槽穴,窄狭,膜质,先端尖或具小尖头;外稃卵形,背部拱形,先端2—4裂,具3脉,中脉自裂片间延伸成芒,侧脉自外侧裂片顶部延伸成短芒或否,基盘具柔毛;内稃宽或狭窄,褶皱,与外稃等长或较之为短;雄蕊3;花柱很短。

模式种: 草沙蚕 *T. bromoides* Roem. et Schult.

本属约有30种,多数分布于亚洲和非洲,大洋洲有1种,美洲有2种;我国现有6种。

本属植物多数可作饲料。

分 种 检 索 表

1. 外稃之主芒短于稃体或近于与之等长。
 2. 外稃主芒长0.5—2.5毫米,显著短于稃体。
 3. 秆高10—30厘米;穗状花序长5—11(15)厘米。
 4. 小穗铅绿色,长5—8(10)毫米,含3—5小花;外稃具芒长1—2毫米…………… 5. 中华草沙蚕 *T. chinensis* (Franch.) Hack.
 4. 小穗带紫色,长约5毫米,常有2—3小花;外稃具芒长约0.5毫米…………… 6. 玫瑰紫草沙蚕 *T. purpurascens* Duthie
 3. 秆高5—8厘米;穗状花序长2—4厘米…………… 7. 矮草沙蚕 *T. humilis* X. L. Yang
 2. 外稃主芒长3—4毫米,与稃体近等长。
 5. 植株高15—30厘米;花序长6—13厘米;第二颖先端2裂,裂齿间伸出长0.5—0.8(1.2)毫米的短芒(1. 草沙蚕 *T. bromoides* Roem. et Schult.)
 6. 小穗长5—8毫米,第二颖长3.5—4.5毫米…………… 1a. 草沙蚕 *T. bromoides* var. *bromoides*
 6. 小穗长(10)14—22毫米,第二颖长4.5—5.5毫米…………… 1b. 云南草沙蚕 *T. bromoides* var. *yunnanensis* (Keng ex J. L. Yang) S. L. Chen et X. L. Yang
 5. 植株高7.5—12.5厘米;花序长2—4厘米;第二颖先端不裂,具小尖头…………… 2. 小草沙蚕 *T. nanus* Keng ex Keng f. et L. Liou
1. 外稃之主芒显著长于稃体,且反曲。
 7. 颖下常具有长不及1.5毫米的小苞片而使小穗有三颖片;外稃主芒长5—8毫米,侧芒长1—3毫米…………… 3. 线形草沙蚕 *T. filiformis* Nees ex Steud.
 7. 颖下不具小苞片;外稃主芒长约4毫米,侧芒仅为长约1毫米的小尖头…………… 4. 长芒草沙蚕 *T. longe-aristatus* Nakai

* 草沙蚕属见中研院自然历史丛刊3卷1号。