

4a. 三芒耳稗草(原变种)

var. *triseta*

多年生。须根较粗。秆高 20—40(60) 厘米,光滑,节具柔毛。叶鞘疏松裹茎,颈部具 1 圈微毛,其余无毛,边缘膜质,均长于节间;叶舌膜质,长约 0.2 毫米,先端截平,具小纤毛;叶片线形,长达 20 厘米,宽 2—7 毫米,扁平或多少内卷,上面疏生柔毛,下面无毛。圆锥花序窄狭,长达 20 厘米,主轴具棱,微粗糙,分枝直立或稍上升,微粗糙,基部者多 3 枚簇生,近顶端孪生或单生;小穗狭披针形,基部具 1 圈短毛,长 3—5 毫米,具微粗糙的柄;颖膜质,近相等,狭披针形,具 3 脉,其脉粗糙,先端渐尖,具细长芒,芒长 3—5 毫米,微粗糙;外稃纸质,等长于颖,披针形,具 1 脉,光滑,先端渐尖具芒,其芒细弱,稍粗糙,长 8—15 毫米,微弯曲;内稃膜质,稍短于外稃,具 2 脉,近基部边缘具耳,耳以上至顶被软柔毛;鳞被 2,小,楔形,先端微凹,光滑;花药长约 1 毫米。 花果期 9—10 月。

产广东、广西等省区;生于海拔 300—500 米的丘陵山地潮湿处。模式标本采自广东罗浮山。

4b. 偃卧耳稗草(变种)(中国高等植物图鉴) 图版 43: 1—3

var. *decumbens* Keng in *Sunyatsenia* 3(1): 18 1935; Santos in *Journ. Arn. Arb.* 25: 91. 1944; 中国高等植物图鉴 5: 857. 1976.

多年生。秆上部直立,基部偃卧并节处生根,高 45—90 厘米,基部径 3—5 毫米,节具短毛,其余无毛。叶鞘疏松裹茎,疏生柔毛,尤以颈部较密,多数长于节间;叶舌膜质,长约 0.2 毫米,先端平截,纤毛状;叶片线形,较长,可达 35 厘米,宽 5—8 毫米,上面被短柔毛、稀疏的疣基长柔毛或粗糙,下面无毛,边缘粗糙。圆锥花序较大,狭窄或稍开展,长 20—40 厘米,分枝贴生或斜上升,长 5—15 厘米;小穗长约 4 毫米,其结构同原变种。 花果期 8—10 月。

产广东省;生于河流旁及荒地上。模式标本采自广东省信宜(sunyi)。

5. 耳稗草(中国高等植物图鉴) 葛氏草(禾本科图说),散穗葛氏草(广州植物名录油印本)

Garnotia patula (Munro) Benth. *Fl. Hongk.* 416. 1861; Rendle in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 36: 386. 1904; Hitchc. in *Lingnan Sci. Journ.* 7: 200. 1929; Santos in *Journ. Arn. Arb.* 25: 90. 1944; 广州植物志 796. 1956; 中国主要植物图说 禾本科 554. 图 483. 1959; 中国高等植物图鉴 5: 145. 图 7119. 1976. — *Berghausia patula* Munro in *Proc. Amer. Acad.* 4: 362. 1860. — *Garnotia drymeia* Hance in *Ann. Sci. Nat. ser. 4.* 18: 233. 1862. — *Garnotia poilanei* A. Camus in *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris* 27: 456. 1921.

5a. 耳稗草(原变种)

var. *patula*