

产广西;生于山坡草地。中南半岛的诸国也有分布。模式标本采自越南北部。

6. 大耳稗草(拟)

Garnotia maxima Santos in Nat. et Appl. Sci. Bull. 10:89—90. 1950.

秆直立或基部稍倾卧,高约 100 厘米,径 3—5 毫米,节间无毛,但节有柔毛。叶鞘与叶片间稍呈有关节;叶鞘长于节间,有隆起的脉,无毛或仅顶部有柔毛,但鞘口常密生柔毛;叶舌膜质,长约 0.5 毫米,撕裂状;叶片上举,长 25—40 厘米,宽 8—12 毫米,线状披针形,扁平,先端渐尖,上面叶脉隆起而粗糙,下面叶脉较光滑,主脉有时粗糙,上面脉间粗糙,近基部有长柔毛,其毛长 3—6 毫米,向顶端亦疏生柔毛,下面的脉间较平滑或有时疏生柔毛,叶缘粗糙。圆锥花序长约 65 厘米,下部常为顶生叶鞘所包;花序上的第一次分枝直立,粗糙,通常长达 22 厘米,常再生出小枝,小枝亦粗糙;小穗长 6—6.3 毫米,宽约 0.75 毫米,狭披针形;小穗柄不等长;颖片 2,近等长,无毛,先端尖,具 3 脉,脉上粗糙,脉间光滑,先端具粗糙直芒,第一颖略短于小穗,具长 3—6 毫米的芒,第二颖等长于小穗,具长 4—8 毫米的芒;外稃等长于小穗,光滑无毛,具 3 脉,先端有 2 齿,齿间伸出长 10—15 毫米的直芒,芒在小穗成熟后可稍曲折;内稃短于外稃,透明膜质;鳞被 2,长约 0.5 毫米,狭楔形,顶端微凹,无毛。

特产海南;生于海拔约 1 000 米的山谷林下。模式标本采自保亭县。

7. 细弱耳稗草(中国高等植物图鉴) 细弱葛氏草(禾本科图说) 图版 43: 4—6

Garnotia tenuis Keng, 中国主要植物图说 禾本科 555. 图 485. 1959. nom. nud.; 中国高等植物图鉴 5: 857. 1976. ex S. L. Chen. in Bull. Nanj. Bot. Gard. Mem. Sun Yat Sen 1988—1989:1—2. 1988—1989.

多年生。秆较细弱,丛生,直立或基部稍膝曲,并在最下部节处生根,高 25—50 厘米,具 2—4 节,基部径 1—2 毫米,无毛。叶鞘疏松裹茎,无毛或有时下部疏被疣基长柔毛,多数长于节间;叶舌纸质,长约 1 毫米,先端截平或浅裂,通常背面具短毛,两侧下延成叶鞘的膜质边缘;叶片线状披针形,扁平,长 3—17 厘米,宽 2—4 毫米,基部渐狭呈柄状,上面被疣基柔毛,下面无毛或有时疏被疣基柔毛。圆锥花序窄狭,主轴具棱,微粗糙,分枝与主轴贴生或多少斜升,长 2—5 厘米,基部者簇生,近顶端孪生或单生;小穗狭披针形,长 3—4 毫米,基部具 1 圈短毛,具微粗糙且与主轴贴生的柄;颖近相等或第一颖稍短,渐尖或具长 0.5—1.5 毫米的短尖头,具 3 脉,脉上稍粗糙,灰绿色带紫色;外稃膜质,披针形,与颖等长,具 3 脉,顶端延伸为 1 芒,芒长 8—14 毫米,劲直或稍曲折,微粗糙,紫色;内稃透明膜质,狭披针形,短于外稃,具 2 脉,近基部边缘具耳,耳以上至顶端被软柔毛;鳞被 2,小,楔形,先端微凹,光滑;花药长约 1.2 毫米。 花果期 9—10 月。

特产贵州、云南等省;生于海拔约 1 700 米干燥山坡或峡谷。模式标本采自贵州贞丰县。

8. 丛茎耳稗草(中国高等植物图鉴) 图版 43: 7—10



1—3. 偃卧耳稗草 *Garnotia trisetata* Hitchc. var. *decumbens* Keng: 1. 秆基部, 2. 小穗, 3. 小花。4—6. 细弱耳稗草 *Garnotia tenuis* Keng: 4. 叶舌, 5. 小穗, 6. 小花。7—10. 丛茎耳稗草 *Garnotia caespitosa* Santos: 7. 植株, 8. 叶舌, 9. 小穗, 10. 小花。(王 颖绘)