

2. 日本柳叶箬(禾本科图说)

Isachne nipponensis Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. **4**: 30. 1935 et **11**: 55. 1942; 中国主要植物图说 禾本科 645, 图 583. 1959; 华东禾本科植物志 180, 图 116. 1962; Keng f. in Acta Phytotax. Sin. **10** (1): 20. 1965; 台湾的禾草 479. pl. 134. 1975; 台湾植物志 **5**: 521. 1978. — *Isachne myosotis* Nees var. *minor* Honda in Bot. Mag. Tokyo **38**: 58. 1924 et in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo sect. 111, Bot. **3**: 281. 1930. — *Isachne nipponensis* Ohwi var. *minor* (Honda) Nemoto in Fl. Jap. Suppl. 933. 1936; Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. **11**: 55. 1942. — *Isachne myosotis* auct. non Nees: Honda in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo sect. 111, Bot. **3**: 281. 1930. — *Isachne miliacea* auct. non Roth: Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 1302. 1936.

2a. 日本柳叶箬(原变种) 图版 56: 7—10

var. **nipponensis**

多年生。秆细柔而蜿蜒,横卧地面,节上易生根,直立部分高 15—30 厘米,具多节,节上被细柔毛。叶鞘短于节间,无毛或有短柔毛,边缘及鞘口具纤毛;叶舌纤毛状,长约 1 毫米;叶片卵状披针形,长 2—5 厘米,宽 0.7—1.5 厘米,顶端渐尖,基部钝圆,边缘稍增厚,微波状,具微小的细锯齿,表面疏生贴伏的疣状细毛,背面具微柔毛。圆锥花序略呈倒卵圆形,基部通常为叶鞘所包,裸露部分长 3—8 厘米,宽 1.5—4 厘米,分枝细弱,斜向上开展,与小穗柄均无腺斑,常作蛇形弯曲;小穗球状椭圆形,淡绿色,长约 1.5 毫米;颖等长或略长于小穗,卵状椭圆形,具 5—7 脉,背部自中部以上疏生纤毛;两小花同质同形,均可结实,椭圆形,长约 1.3 毫米;外稃被微毛,与内稃均变硬而为革质。颖果半球形,长约 0.8 毫米。染色体数 $2n = 40$ (Chen et Hsu, 1961)。花果期夏秋季。

产浙江、江西、福建、湖南、广东、广西;多生于海拔 1 000 米以下的山坡、路旁等潮湿草地中。朝鲜、日本也有分布。模式标本采自日本。

2b. 江西柳叶箬(变种)(植物分类学报)

var. **kiangsiensis** Keng f. in Acta Phytotax. Sin. **10** (1): 21. 1965.

与原变种的区别是,花序分枝及小穗柄均具明显的腺斑。

产江西、福建;生于海拔 300—400 米的杉木竹林中。模式标本采自江西萍乡。

3. 荏弱柳叶箬(禾本科图说) 图版 56: 11—14

Isachne debilis Rendle in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 322. 1904; Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 1, suppl. 350. 1906; Hayata, Icon. Pl. Formos. **7**: 58. 1918, p. p.; Honda in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo sect. 111, Bot. **3**: 278. 1930; Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. **11**: 55. 1942; 中国主要植物图说 禾本科 647, 图 584. 1959; Keng f. in Acta Phytotax. Sin. **10** (1): 21. 1965; 台湾的禾草 469, pl. 129.