

亚洲、欧洲、美洲、非洲等温暖地区都有栽培。

本种为人类最早的栽培谷物之一，谷粒富含淀粉，供食用或酿酒，秆叶可为牲畜饲料。由于长期栽培选育，品种繁多，大体分为粘或不粘两类，本草纲目称粘者为黍，不粘者为稷；民间又将粘的称黍，不粘的称糜。

4. 南亚稷(禾本科图说) 矮黍(广州植物志) 图版 61: 1—8

Panicum walense Mez in Engler, Bot. Jahrb. **34**: 146. 1904; W. D. Clayton in Kew Bull. **20**:264. 1966; H. B. Gill. et al. Fl. Malaya **3**: 140. 1971; 台湾的禾草 571. 图 180. 1975; 台湾植物志 **5**: 578. 1978 (sphalm. ‘watense’); 海南植物志 **4**: 407. 1977.—*Panicum austroasiaticum* Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. **2**: 45. 1942; Jansen in Renwaedtia **2**: 314. 1953; 中国主要植物图说 禾本科 658. 图 600. 1959; Bor, Grass Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 324. 1960; Hsu in Journ. Jap. Bot. **38**(3): 79. et in Journ. Fac. Sci. Univ. Toky. Sect. III. Bot. **9**(3):127. 1965; 中国高等植物图鉴 **5**:159. 1976.—*Panicum vescum* Stewart in Brittonia **5**: 452. 1945. —*Panicum humile* auct. non Thunb. ex Trin.: Nees ex Steud. Syn. Pl. Glum. **1**: 84. 1854; 广州植物志 806. 1956.

一年生，簇生草本。秆纤细，基部膝曲，高 10—40 厘米。叶鞘通常短于节间，松弛，无毛或边缘被纤毛；叶舌膜质，长 0.5—1 毫米，顶端具睫毛；叶片平展或内卷，狭线形，长 3—15 厘米，宽 1.5—4 毫米，顶端渐尖，基部微收狭，边缘光滑。圆锥花序长 5—10 厘米，分枝细，斜向开展，粗糙，疏生小穗；小穗具柄，椭圆形或卵状长圆形，长约 1.5 毫米，顶端尖，无毛，熟时紫红色；第一颖尖卵形，长约为小穗的 2/3—3/4，顶端渐尖，基部包卷小穗，具 3—5 脉，边缘膜质；第二颖顶端喙尖，具 5 脉，第一外稃稍短于第二颖，顶端喙尖，具 5 脉，其内稃薄膜质，短于第一外稃；第二外稃革质，长圆形或狭长圆形，长约 1.2 毫米，顶端钝，背面弓形，平滑光亮，白色后变淡灰色。鳞被细小，多脉，长约 0.2 毫米，宽约 0.3 毫米。染色体 $2n = 18$ (Larsen, 1963)。 花果期 8—12 月。

产台湾、广东、海南、广西和西藏等省区；生于旷野或田间。印度、斯里兰卡、马来西亚和西非等地也有分布。模式标本采自塞内加尔。

本种长时间中外学者采用 *Panicum austroasiaticum* Ohwi (模式产斯里兰卡)。W. D. Clayton, 1966 年指出本种与 *Panicum walense* Mez (模式产塞内加尔) 同为一种，惟种名“*watense*”应为“*walense*”之误。

5. 大罗网草(广州植物志) 网脉稷(禾本科图说) 图版 61: 13—18

Panicum cambogiense Balansa in Journ. de Bot. **4**:142. 1890; Reeder in Journ. Arn. Arb. **29**:268. 1948; 广州植物志 805. 1956; 中国主要植物图说 禾本科 657. 图 597. 1959; Bor, Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 325. 1960; Hsu in Journ. Jap. Bot. **38**(3): 80. 1963, 台湾的禾草 553. 图 171. 1975; 台湾植物志 **5**: 572. 1978; H.



1—8.南亚梗 *Panicum walense* Mez: 1.植株, 2.第一颖, 3.第二颖,
4.第一外稃, 5.第一内稃, 6.小穗, 7.鳞被, 8.叶部分放大示叶舌。9—12.细柄
梗 *Panicum psilopodium* var. *psilopodium*: 9.植株, 10.小穗, 11.鳞
被, 12.叶部分放大示叶舌。13—18.大罗网草 *Panicum cambogineae* Ba-
lsana: 13.小穗, 14.第一颖, 15.第二颖, 16.第一外稃, 17.第一内稃, 18.鳞
被。(韦力生绘)