

3.5—4 毫米,绿色或桔黄色;第一颖质薄而透明,长为小穗的 $1/4—1/5$,顶端截平或圆钝,脉不明显;第二颖椭圆状披针形,与小穗等长,具 7—9 脉;第一外稃与第二外稃同形,等长,其内稃缺或甚窄小;第二小花长圆形,长约 2.5 毫米,顶端尖,平滑光亮。鳞被多脉,长约 0.48 毫米,宽约 0.5 毫米,部份折叠。染色体 $2n = 54$ (Chen et Hsu, 1961)。花果期 9—11 月。

产广东、广西、福建、台湾和云南等省区;多生于静水或池边淤泥中。印度、马来西亚及大洋洲等地也有分布。模式标本采自印度。

8. 洋野黍(台湾的禾草)

Panicum dichotomiflorum Michx. Fl. Bot. Amer. 1: 48. 1803; Hitchc. Man. Grass. Unit. Stat. ed. 2. 685. f. 1034. 1950; 台湾的禾草 553A 图 171. 1975; 台湾植物志 5: 572. 1978.

一年生草本。秆多分枝,高 30—100 厘米,无毛。叶鞘圆筒状,平滑,有光泽;叶舌很短,顶端具长纤毛;叶片线形,长 15—40 厘米,宽 7—20 毫米;主脉粗,绿白色。圆锥花序长约 30 厘米,每节 1—5 分枝,分枝粗糙,约呈 45 度角斜上;小穗疏生,卵状长椭圆形至披针状长椭圆形,长约 2.3 毫米,平滑;第一颖宽三角形,钝尖或圆钝,包围小穗基部,长为小穗的 $1/4—1/5$;第二颖与小穗等长,具 5—7 脉;第一外稃与第二颖同形同大;第二外稃长椭圆形,平滑且有光泽,具 5 脉,在成熟时较明显。雄蕊 3。染色体 $2n = 36$ (Brown, 1948), 54 (Church., 1929; Gould, 1958)。花果期 6—10 月。

本种原产北美,我国台湾引种已归化;一些温带国家亦有引种。

组 3. 匍匐黍组——Sect. Repentia Stapf

Stapf in Prain. Fl Trop. Afr. 9: 640, 648. 1920; Hsu in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. III. vol. 9(3):129. 1965.

小穗长 2.5—5 毫米,具柄;第一颖长为小穗的 $1/4—1/8$;第二外稃光滑,其表皮组织平滑而有模糊的棱脊;鳞被无清晰的脉纹;颖果白色或黄色;叶片主脉在下面明显,于上面下凹而不明显,侧脉亦不明显;叶片表皮组织的两面长细胞壁厚;叶舌膜质,短,上缘具长纤毛。多年生草本;常有匍匐茎,不育枝似对生。

模式种: 铺地黍 *P. repens* L.

本组我国产 2 种。

9. 铺地黍(广州常见经济植物) 枯骨草(海南植物志) 图版 62: 1—8

Panicum repens L. Sp. Pl. ed. 2. 87. 1762; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5:32. 1927; Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. 11:47. 1942; 广州植物志 804. 1956; 中国主要植物图说 禾本科 650. 图 589. 1959; Bor, Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 330. 1960; Hsu in Journ. Jap. Bot. 38(3):84. 1963, 台湾的禾草 567. 图 178. 1957; 台湾植物志 5: