

(Moriya A., Kondo, 1950), 40 (Tateoka, 1954)。

产江苏、浙江、台湾、福建、江西、湖北、湖南、四川、贵州、云南、广西、广东等省区；生于荒野潮湿草地。日本、朝鲜均有分布。模式标本采自日本。

7. 长叶雀稗(华南经济禾草) 图版 87: 1—5

Paspalum longifolium Roxb. Fl. Ind. 1: 283. 1820; Merr. in Lingnzn Sci. Journ. 5: 29. 1927; Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. 11: 41. 1942; 中国主要植物图说 禾本科 687, 图 630. 1959; Bor, Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 339. 1960; Gill. et al. Fl. Malaya 3: 182, pl. 14. 1971; 台湾的禾草 585, 图 187. 1975, 台湾植物志 5: 586. 1978; 海南植物志 4: 425. 1977. —— *Paspalum scrobiculatum* var. *longifolium* (Roxb.) Domin. Bibl. Bot. 85: 288. 1915.

多年生。秆丛生，直立，高 80—120 厘米，粗壮，多节。叶鞘较长于其节间，背部具脊，边缘生疣基长柔毛；叶舌长 1—2 毫米；叶片长 10—20 厘米，宽 5—10 毫米，无毛。总状花序长 5—8 厘米，6—20 枚着生于伸长的主轴上。穗轴宽 1.5—2 毫米，边缘微粗糙；小穗柄孪生，长 0.2—0.5 毫米，微粗糙；小穗成 4 行排列于穗轴一侧，宽倒卵形，长约 2 毫米；第二颖与第一外稃被卷曲的细毛，具 3 脉，顶端稍尖；第二外稃黄绿色，后变硬；花药长 1 毫米。花果期 7—10 月。

产台湾、云南、广西、广东；生于潮湿山坡田边。印度、马来西亚至大洋洲以及日本均有分布。模式标本采自印度。

本种以小穗被微毛，孪生，交互排列于穗轴一侧，成 4 行，与圆果雀稗有别。

8. 两耳草(广州常见经济植物) 图版 88: 1—6

Paspalum conjugatum Berg. in Acta Helv. Phys. Math. 7: 129. pl. 8. 1762; Rendle in Journ. Linn. Soc. 36: 319. 1904; Hitchc. in Lingnan Sci. Journ. 7: 215. 1931, et Man. Grass. Unit. Stat. 615. f. 892. 1951; 广州植物志 814. 1956; 中国主要植物图说 禾本科 687, 图 633. 1959; Bor. Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 336. 1960; Gill. et al. Fl. Malaya 3: 180, f. 37. 1971; 海南植物志 4: 425. 1977. 台湾植物志 5: 581. 1978; —— *Paspalum ciliatifolium* Trin. in Mem. Acad. Sci. Petersb. Ser. 6, 3 (2): 340. 1834. —— *Paspalum hirsutum* Poir. in Lam. Encycl. Meth. Bot. 5: 28. 1804.

多年生。植株具长达 1 米的匍匐茎，秆直立部分高 30—60 厘米。叶鞘具脊，无毛或上部边缘及鞘口具柔毛；叶舌极短，与叶片交接处具长约 1 毫米的一圈纤毛；叶片披针状线形，长 5—20 厘米，宽 5—10 毫米，质薄，无毛或边缘具疣柔毛。总状花序 2 枚，纤细，长 6—12 厘米，开展；穗轴宽约 0.8 毫米，边缘有锯齿；小穗柄长约 0.5 毫米；小穗卵形，长 1.5—1.8 毫米，宽约 1.2 毫米，顶端稍尖，复瓦状排列成两行；第二颖与第一外稃质地较薄，无脉，第二颖边缘具长丝状柔毛，毛长与小穗近等。第二外稃变硬，背面略隆起，卵形，包



1—5.长叶雀稗 *Paspalum longifolium* Roxb.: 1.花序, 2.小穗背面,
3.小穗腹面, 4.第二小花腹面, 5.花丝与雌蕊。6—11.雀稗 *Paspalum thunbergii* Kunth ex Steud.: 6.植株下部, 7.花序, 8.小穗背面, 9.小穗腹面, 10.第二小花腹面, 11.雄蕊与雌蕊。12—16.圆果雀稗 *Paspalum orbiculare* Forst.: 12.植株上部带花序, 13.小穗背面, 14.小穗腹面, 15.第二小花腹面, 16.雄蕊与雌蕊。(刘春荣绘)