

小花两性，稍短于第一小花；花药长 1.5 毫米；花柱离生。 花果期夏秋季。

产于广西、云南；生于丘陵、路旁草丛中。中南半岛、印度、斯里兰卡等也有分布。模式标本采自斯里兰卡。

45. 蛇尾草属* *Ophiuros* Gaertn. f.

Gaertn. f. *Fruct. et Sem. Pl.* 3: 3. *Pl.* 181. f. 4. 1805; Clayton
et Renvoize, *Gen. Gram.* 367—368. 1986. — *Ophiurus* R. Br. *Prodr.*

206. 1810.

多年生较高大的草本。叶扁平。总状花序圆柱形，单生于秆顶；有柄小穗完全退化，其柄与总状花序轴节间愈合；无柄小穗嵌入轴的凹穴中，在轴的两侧互生；生于轴同侧的各无柄小穗均排列在一条直线上，其第一颖顶端指向一直线方向；第一颖革质，长卵形，两侧对称，顶端急尖，基部截平，背面圆拱；第二颖纸质，舟形；第一小花常为雄性；第二小花两性。

属名模式：蛇尾草 *O. corymbosus* (Linn. f.) Gaertn. = *O. exaltatus* (Linn.) Kuntze
本属约 4 种，分布于亚洲、大洋洲和非洲热带地区。我国有 1 种。

1. 蛇尾草（种子植物名称） 图版 69

Ophiuros exaltatus (Linn.) Kuntze, *Rev. Gen. Pl.* 2. 780. 1891; Merr. in *Lingnan Sci. Journ.* 6: 272. 323. 1923; 中国主要植物图说·禾本科 803. 图 755. 1959; Bor, *Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist.* 199. 1960; 中国高等植物图鉴 5: 194. 图 7218. 1976; 海南植物志 4: 467. 图 1254. 1977. — *Aegilops exaltata* Linn. *Mant.* 2: 575. 1771. —
Ophiuros corymbosus Gaertn. f. *Fruct. et Sem. Pl.* 3: 3. *Pl.* 181. f. 4. 1805.

多年生粗壮草本。秆坚硬，高 1—2 米，直径 4—6 毫米，基部常具枯萎宿存的叶鞘，无毛。叶鞘无毛，或于上部背面和边缘有白色糙毛；叶舌短，截形，叶片线状披针形，先端长渐尖，基部圆形至心形，长 30—40 厘米，宽 1—1.5 厘米，边缘常生疣基毛。总状花序甚多，自秆顶和上部叶鞘中伸出，细长圆柱形，直立或微弯，无毛，长可达 12 厘米，直径约 1.2 毫米，总状花序轴节间与无柄小穗等长，约 3—4 毫米。无柄小穗卵状长圆形，嵌生于轴节间的凹穴中，在两侧互生，长约 3 毫米；第一颖质厚，两侧对称，在轴同一侧的各小穗顶端指向一直线方向，背面有 4 行小窝点或平滑无窝点，成熟后先端稍外张；第二颖与第一颖等长，贴生于凹穴中；第一小花内外稃均为膜质，雄性；第二小花两性。花果期夏秋季。

产于广东、广西及海南等省区，近年在云南东南部也采到；多生于山间草丛中。印

* 蛇尾草属见耿以礼等《分科检索表附录》。