

2.5 毫米。 花果期 8—9 月。

产于辽宁省(大连市)。朝鲜、日本也有。

25. 猪毛草 图版 XI, 8—11

Scirpus wallichii Nees in Wight, Contrib. Bot. Ind. (1834) 112; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 113—*Scirpus sasaki* Hayata, Ic. Pl. Formos. VI (1916) 115.

丛生,无根状茎。秆细弱,高 10—40 厘米,平滑,基部具 2—3 个鞘,鞘管状,近于膜质,长 3—9 厘米,上端开口处为斜截形,口部边缘干膜质,顶端钝圆或具短尖。叶缺如。苞片 1 枚,为秆的延长,直立,顶端急尖,长 4.5—13 厘米,基部稍扩大;小穗单生或 2—3 个成簇,假侧生,长圆状卵形,顶端急尖,长 7—17 毫米,宽 3—6 毫米,淡绿色或淡棕绿色,具 10 多朵至多数花;鳞片长圆状卵形,顶端渐尖,近于革质,长 4—5.5 毫米,背面较宽部分为绿色,具一条中脉延伸出顶端呈短尖,两侧淡棕色、淡棕绿色或近于白色半透明,具深棕色短条纹;下位刚毛 4 条,长于小坚果,上部生有倒刺;雄蕊 3,花药长圆形,药隔稍突出;花柱中等长,柱头 2。小坚果宽椭圆形,平凸状,长约 2 毫米,黑褐色,有不明显的皱纹,稍具光泽。 花果期 9—11 月。

产于我国福建、江西、台湾、广东、广西、贵州、云南;多生长在稻田中,或溪边、河旁近水处,在云南生长在海拔 1000 米左右的地区。有时常和谷精草属 *Eriocaulon* 植物长在一起。分布于朝鲜、日本及印度。

26. 荆門蘆草 图版 XII, 16—19

Scirpus jingmenensis Tang et Wang, sp. nov.

根状茎短。秆丛生,高 10—32 厘米,直径 2—3 毫米,圆柱状,平滑,具槽,基部具 2—3 个叶鞘;鞘长 1.5—9 厘米,顶端呈斜口,常从干膜质部分开裂,最上面一个叶鞘顶端常具叶片;叶片长 1—1.7 厘米,纤细。苞片 1 枚,近于圆柱状,长 13—18 厘米,有时较秆还长,基部两侧扩大,具膜质边缘;小穗 5—10 余个聚集成头状,假侧生,基部具鳞片状小苞片,小苞片长约 4—10 毫米,卵形或宽披针形,淡棕色;小穗无柄,长圆形或线状披针形,长 7—20 毫米,宽约 3 毫米,具多数花;鳞片长圆形,顶端钝圆,具短尖,膜质,长约 2 毫米,淡棕色,稍有褐色条纹,背面具 1 条脉,少有 3 条脉,具缘毛,在果实成熟时鳞片脱落;下位刚毛 4—6 条,较小坚果长约一倍,上生倒刺;雄蕊 1—2 个,花药短,椭圆形;花柱长,柱头 2,细长。小坚果倒卵形,平凸状,长约 1 毫米,黑褐色,表面有不很明显的皱纹,具光泽。 果期 9 月。

产于湖北省(荆门县后港)。

27. 吉林蘆草 图版 XII, 24—27

