

Scirpus schoofii Beetle in Amer. Journ. Bot. XXIX (1942) 654.

具須根。 稈丛生,高 30—60 厘米,直径 2.5—3.5 毫米,扁圓形或圓柱状,平滑,基部具 2—3 个叶鞘,鞘长 2—16 厘米,上端开口处呈斜截形,邊緣干膜質,淡棕色,頂端鈍圓,具短尖,无叶片。苞片 1 枚,为稈的延长,长 8—30 厘米;小穗 8—20 余个簇生成头状,假側生,卵形或长圓状卵形,长 3—10 毫米,寬 2—3 毫米,具多数花;鱗片椭圆形或近于倒卵形,頂端鈍或圓,膜質,长约 3 毫米,背面綠色,具 1—3 条明显的脉,中脉延伸出頂端呈短尖,兩側褐黃色或褐色并具多数不明显的脉,邊緣具緣毛;下位刚毛极短,无倒刺或順刺;雄蕊 3,花药短,近于狭卵形,药隔稍突出;花柱中等长,柱头 3。小坚果寬倒卵形,三棱形,长约 1 毫米,成熟时呈黑色,具密的橫皺紋。 花果期 8—9 月。

产于我国云南省(东川市);生长在湖边等湿地上,海拔 2300 米左右。

30. 仰臥稈蘆草

Scirpus supinus Linn., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 49 — *Isolepis supinua* R. Br. Prod. (1810) 77.

var. **supinus**.

本变种不产于我国。根据文献記載它从欧洲分布至中亚。

稻田仰臥稈蘆草(变种) 图版 XII, 5—7

var. **lateriflorus** (Gmel.) T. Koyama in Journ. Fac. Sci., Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. VII, 6 (1958) 302 — *Scirpus lateriflorus* Gmel., Syst. Veg. (1791) 127 — *Scirpus erectus* Poir., Encl. Méth. IV (1804) 761 — *Scirpus erecto-gracilis* Hayata, Ic. Pl. Formos. VI (1916) 114, f. 31 — *Scirpus oryzetorum* (Steud.) Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 112 — *Isolepis supina* Benth., Fl. Hongk. (1861) 394, non R. Br. — *Scirpus supinus* Hance, Fl. Hongk. Suppl. (1872) 43, non Linn.; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 254; Dunn et Tutch., Fl. Kwangt. & Hongk. (1912) 300.

本变种与种的区别在于稈为不明显的三棱形,干时有明显条紋;基部的叶鞘頂端具或长或短的叶片。花序或多或少具輻射枝和小苞片;鱗片頂端稍鈍,具短尖,兩側近于无脉。小坚果較小,长 1—1.3 毫米,表面上皺紋不很明显。 花果期 11—1 月。

产于我国广西(百色县)、云南(宾川县)、广东、台湾;生长于路旁湿地上。分布于印度、錫兰、馬來亞以及澳洲。

多皺紋果仰臥稈蘆草(变种) 图版 XII, 12—15