

稈細長。苞片近佛焰苞狀；長側枝聚繖花序十分減退只有幾個小穗，很少只有 1 個小穗；下位剛毛非常細且彎曲，不露出鱗片外。

33. 三稜稈蘆草 圖版 XIII, 17—20

Scirpus mattfeldianus Kükenth. in Fedde, Repert. Nov. Sp. XXVII (1929) 108; Merr. in Lingn. Sci. Journ. XIII (1934) 18.

根狀莖短，木質，具細長須根。稈密叢生，細長，堅挺，高 20—100 厘米，明顯三稜形，無節，平滑，下部具 4—6 個葉鞘，鞘淡棕色，裂口處為薄膜質，棕色，最上面一個長達 20 厘米，頂端葉片退化成短尖或呈鉗狀，長 3—12 毫米，邊緣粗糙。苞片鱗片狀，披針形或長圓狀卵形，頂端具短尖；小穗單一頂生，或 2—4 個排列成蝎尾狀聚繖花序，橢圓形或長圓形，長 6—7 毫米，寬 2—3 毫米，具少數花；鱗片排列疏松，長圓狀卵形，頂端急尖，膜質，長 3—4 毫米，紅棕色或棕色，背面具一條中肋，伸出頂端呈短尖；下位剛毛 6 條，長于小堅果，上部疏生順刺；雄蕊 6，花藥綫形，長約 2 毫米；花柱細長，柱頭 3，細長。小堅果長圓形或長圓狀倒卵形，三稜形，長約 1.8 毫米，褐色。花果期 4—5 月。

产于浙江、貴州、廣東；生長于森林邊緣濕地。

34. 莖頭狀花序蘆草 龍須草(粵)

Scirpus subcapitatus Thw. Enum. Pl. Zeyl. (1864) s51; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 254; Chien in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China III (1927) 31——*S. clarkei* Stapf in Trans. Linn. Soc. ser. 2 IV (1894) 244.

var. *subcapitatus*.

根狀莖短，密叢生。稈細長，高 20—90 厘米，直徑 0.7—1 毫米，近于圓柱形，平滑，少數在稈的上端粗糙，無稈生葉，基部具 5—6 個葉鞘，鞘棕黃色，裂口處薄膜質，棕色，愈向上鞘愈長，最上面一個長可達 15 厘米，頂端具很短的、鉗狀的葉片，最長的葉片達 2 厘米，邊緣粗糙。苞片鱗片狀，卵形或長圓形，長 3—7 毫米，頂端具較長的短尖；蝎尾狀聚繖花序小，具 2—4 (—6) 小穗；小穗卵形或披針形，長 5—10 毫米，寬約 2 毫米，具幾朵至十幾朵花；鱗片排列疏松，卵形或長圓狀卵形，頂端急尖或鈍，皮紙質，長 3.5—4.5 毫米，麥稈黃色或棕色，背面具一條綠色的脈，有時伸出頂端呈短尖；下位剛毛 6 條，較小堅果長約一倍，幼時較子房長 2 倍，上部具順向短刺；雄蕊 3，花絲長，花藥綫形，長約 2 毫米；花柱短，柱頭 3，細長，被乳頭狀小突起。小堅果長圓形或長圓狀倒卵形，三稜形，稈明顯隆起，長約 2 毫米，黃褐色。花果期 3—6

