

卵形,三棱形,黄色,长约2毫米。 花果期8月。

产于吉林;分布于日本、朝鲜、苏联阿穆尔州。

組 2. 具叶片羊胡子草組 Sect. *Phyllanthella* Anderss., *Cyper. Scand.* (1849) 12.

具匍匐根状茎。稈散生。稈生叶有叶片。苞片叶状;小穗少数,排列为简单长侧枝聚繖花序;鳞片有1至数条脉;下位刚毛极多数,无刺。

3. 寬叶羊胡子草 图版 XV, 1—4

Eriophorum latifolium Hoppe, *Bot. Taschenb.* (1800) 108; C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc. Bot.* XXXVI (1903) 256; Kom. in *Act. Hort. Petrop.* XX (1901) 338; Ohwi, *Cyper. Jap. II* in *Mem. Coll. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. B.* XVIII (1944) 89——*Eriophorum polystachyon* Linn. *Sp. Pl. ed. 1* (1753) 52, pro pte.——*Scirpus angustifolius* (Honck.) T. Koyama subsp. *latifolius* (Hoppe) T. Koyama in *Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot.* VII (1958) 356.

多年生草本具短而細的匍匐根状茎。稈圓柱状或三棱形,高35—114厘米,光滑,具基生叶,叶平张,短于稈,边缘粗糙,漸向頂端漸狹,近頂端三棱形,寬2—9毫米,稈生叶1—3枚,具叶片,近頂端三棱形,頂端圓鈍,具长鞘,鞘管状,上部稍膨大,黑紫色。苞片2—3,直立,下部呈鞘状,深褐色,上部呈叶状,近頂端三棱形,頂端鈍;长侧枝聚繖花序简单,有4—10个小穗;小穗有的稍下垂,卵形或长椭圆形,长4—5厘米;小穗柄长短不等,扁三棱形或圓柱状,粗糙;鳞片卵披針形、卵形或披針状卵形,頂端鈍,膜质,灰黑色,边缘近干膜质,具1条脉;下位刚毛极多数,长3—4厘米;药隔不突出于花药頂端,花药长1.5—4毫米。小坚果长椭圆形,三棱形,紫黑色或深褐色,下部稍狭,长2—3毫米。 花果期6—8月。

产于黑龙江、吉林、内蒙古;喜生于潮湿处,如在潮湿草甸子、浅水中、潮湿平原、砂丘間湿地、江岸边或山脚下。分布于朝鲜北部、欧洲北极和亚洲北极地区、苏联西伯利亚和高加索及小亚西亚等地。

4. 細稈羊胡子草 图版 XV, 6—9

Eriophorum gracile Koch in *Roth, Catalect. II* (1800) 259; Kom. in *Act. Hort. Petrop.* XX (1901) 337; Ohwi, *Cyper. Jap. II* in *Mem. Coll. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. B.* XVIII (1944) 88——*E. coreanum* Palla in *Oesterr. Bot. Zeitschr.* LIX (1905) 190——*Scirpus ardea* T. Koyama in *Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot.* VII (1958) 354——*Scirpus ardea* T. Koyama var. *coreanus* (Palla) T. Koyama, l. c. 355, fig. 18B.

