

30—75 厘米,直径近 5 毫米,灰黄色,无横隔膜,无节,光滑无毛。叶缺如,只在稈的基部有二个叶鞘;鞘膜质,高 5—18 厘米,在外面的矮,黑色微紫,在里面的高,微黄色,三稜管状,抱莖,頂端急尖,鞘口斜。小穗圓柱状,頂端鈍,长 2—4 厘米,直径 5 毫米,淡褐色,有較少数花;在小穗基部有一片不育鱗片,寬卵形,頂端鈍圓,抱小穗基部一周;其余鱗片全有花,松散地复瓦状排列,寬卵形,頂端鈍圓,长 5 毫米,闊大致相同,背面淡褐色,有多数紫色条紋,居中者长,两边短,背部革质,漸近兩側和下右角漸薄,邊緣干膜质,頂端具干膜质邊緣,外面无細点,里面有紅棕色細点,具一条中脉;下位剛毛 6 条,长約为小坚果的二倍,微褐色,有倒刺;柱头 3。小坚果寬倒卵形,双凸状,长 2.5 毫米,寬 1.5 毫米,微白玉黄色,表面有較寬的橫矩形網紋,頂端显著縮呈頸状;花柱基从基部向上漸狹而呈二等边三角形,扁,黑褐色,不为海綿质,基部呈盘状,质地,色泽与小坚果相同,寬几为小坚果的 1/2。

产于云南;生沼泽中。

6. 空心稈茅 图版 XIX, 7—9

Heleocharis fistulosa (Poir.) Link in Spreng. Jahrb. III (1820) 78; Diels in Engl. Bot. Jahrb. XXIX (1901) 228; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 227; Hayata, Ic. Pl. Formos. VI (1916) 107; Svens. in Rhodora XXXI (1929) 152, t. 188, f. 3.

具細长的匍匐根状莖。稈多数,丛生,直立,細弱,銳三稜柱状,无横隔膜,无节,几中空,微紅色,高 14—34 厘米,直径 2 毫米。叶缺如,只在稈的基部有 2—3 个叶鞘;鞘近膜质,暗紅色,鞘口斜,頂端急尖,抱莖,高 2—8 厘米。小穗圓柱状,頂端漸尖,长 1.5—4 厘米,直径 3 毫米,蒼白色,有多数花,在小穗基部有一片寬卵形鱗片,中空无花,抱小穗基部一周;其余鱗片松散地复瓦状排列,全有花,狹卵形,頂端鈍圓,长 4.5 毫米,寬 2.5 毫米,背部革质,緣干膜质,具 1 条中脉;下位剛毛 6 条,长为小坚果的一倍半,有倒刺;柱头 3。小坚果倒卵形或圓倒卵形,双凸状,頂端稍縮,长 1.7 毫米,寬 1 毫米多,微黄色,表面細胞呈四至六角形;花柱基从基部向上漸狹呈扁三角形,不为海綿质,基部明显呈頸状的环,环与小坚果质地相同,寬为小坚果的 3/5。花果期 6—9 月。

产于广东、海南、福建、台湾;生水田中或向阳潮湿之地。分布于越南、緬甸、印度、馬來亞和錫兰,热带很普通。

7. 假馬蹄(广州植物誌) 图版 XIX, 10—12

Heleocharis ochrostachys Steud., Synops. II (1855) 80—*Scirpus laxiflorus* Thw. Enum. Pl. Zeyl. (1864) 435; Hance in Journ. Linn. Soc. Bot. XIII (1873)

