

組 1. 三柱頭組 Sect. *Trichelostylis* (Lest.) Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. III (1883) 1049——*Trichelostylis* Lest. Ess. Fam. Cyp. (1819) 40.

具根狀莖或無，少有具匍匐根狀莖；稈叢生，很少單生，下部很少具無葉片的鞘。葉存在，很少沒有。花序多數為長側枝聚繖花序，很少成頭狀或只 1 個小穗；鱗片短尖一般直出，很少向外彎；花柱不扁，無緣毛，少有近于扁，柱頭 3，罕 2。小堅果倒卵形，有時為長圓形，在少數長圓形果上具微突起的細點，黃白色或褐色，很少黑色。

系 1. 刺蝟穗系 Ser. *Echinolytrum* (Desv.) Tang et Wang, comb. nov.——*Echinolytrum* Desv. in Journ. Bot. I (1808) 20, t. 1, pro gen.

無根狀莖。稈叢生，基部不具無葉片的鞘。鱗片的短尖直出或向外彎，褐色或黃綠色；柱頭 2，少數 2 和 3 個兼有。小堅果長圓形，褐色或黃色，具乳頭狀突起或無。

### 1. 疣果飄拂草

*Fimbristylis verrucifera* (Maxim.) Makino in Bot. Mag. Tokyo IX (1895) 259——*Isolepis verrucifera* Maxim. Prim. Fl. Amur. (1859) 300——*Scirpus verruciferus* (Maxim.) Meinsh. in Act. Hort. Petrop. XVIII (1901) 246——*Fimbristylis dipsacea*. Kom. in Act. Hort. Petrop. XX (1901) 346, non Benth.

無根狀莖。稈密叢生，細，光滑。葉較稈短得多，毛髮狀，柔軟，內捲或近于平張，長 3—5 厘米，寬 0.25—0.5 厘米；鞘銹褐色，無毛，薄膜質，鞘口斜裂。苞片 3—10 枚，毛髮狀，最下面 1—2 枚有時稍高于花序；長側枝聚繖花序簡單或近于復出，有少數至多數小穗，輻射枝 3—10 個不等長，細，張開；小穗單生，少有 2 個簇生，長圓形或圓卵形，長 3—6 毫米，寬 2—2.5 毫米，有多數花；鱗片長圓形或長圓狀卵形，薄膜質，淡白色或淡麥稈黃色，頂端鈍，具直的短尖，背面具綠色龍骨狀突起，有一條脈，長約 1 毫米（不連短尖），短尖長約 0.25—0.3 毫米；雄蕊 1，花藥披針形，頂端具短尖；花柱無毛，基部稍肥厚，柱頭 2。小堅果狹長圓形，圓筒狀，具光澤，褐色，兩邊有 4—6 個白色，具柄，球形的乳頭狀突起（突起後來脫落），基部近于截形，具細柄，表面細胞呈橫的，近于六角形的網紋或近于綫形的橫紋。

產于浙江，根據文獻記載，東北各省亦有，但我們還未見到標本；也分布于蘇聯阿穆爾州、日本、朝鮮。

### 2. 起絨飄拂草 圖版 XXV, 14

*Fimbristylis dipsacea* (Rottb.) Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. III