

圓形網紋,但无疣状突起,长1毫米弱。 花果期8—11月。

产于四川、湖北、陝西、云南、江西、安徽、江苏、广东;生长在耕地上、岩石上、沼泽地中、河边、山溪边、山谷水塘边、水沟边,海拔130—2000米。

系3. 扁鞘飘拂草系 Ser. *Complanatae* Tang et Wang, ser. nov.

具根状茎或匍匐根状茎。 秆丛生,基部不具无叶片的鞘。 鳞片褐色;花柱不扁,无緣毛,柱头3。 小坚果黄白色或褐色。

6. 西南飘拂草 图版 XXVI, 6—9

Fimbristylis thomsonii Böckl. in *Linnaea* XXXVII (1871):37; C. B. Clarke in *Journ. Linn. Soc. Bot.* XXXVI (1903) 246; Dunn et Tutch. *Fl. Kwangt. & Hongk.* in *Kew Bull. Add. Ser. X* (1912) 300; Ohwi, *Cyper. Jap. II* in *Mem. Coll. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. B. XVIII* (1943) 65; Chun et How in *Act. Phytotax. VII* (1958) 86——*Fimbristylis complanata* Benth. *Fl. Hongk.* (1861) 393, non Link.

根状茎短;秆丛生,扁钝三棱形,高(11—)25—70厘米,具沟槽,基部生多数叶,叶稍短于秆或为秆的 $1/4$ — $1/2$ 长,宽2—4.5毫米,平张,坚硬,边缘有细齿,顶端急尖;鞘褐色,前面膜质,铁锈色,顶端截形。叶状苞片2—3枚,较花序短得多;小苞片钻状,基部较宽;长侧枝聚繖花序复出或多次复出,辐射枝2—4个,稍扁,长0.7—3.5厘米;小穗单生,长圆状卵形或椭圆形,顶端急尖,长5—10毫米,宽2—3毫米,有7—10多朵花;鳞片凹,卵形,顶端急尖,长2.2—3.5毫米,栗褐色,边缘膜质,色较淡,有5—7条脉,中肋绿色,延伸成硬尖;雄蕊3,花药狭长圆形,长2毫米,较花丝长约1倍,顶端急尖,药隔不突出;子房近似三棱状长圆形,基部稍狭,花柱三棱形,无緣毛,基部膨大呈长圆状圆锥形,柱头3,很长,稍长于花柱。 小坚果倒卵形,钝三棱形,长2毫米,黄白色或黄色,具横长圆形网纹和横长圆形或圆形疣状突起。 花果期5—6月。

产于广东、海南岛、广西、台湾、云南;常生长在草坡上,海拔170—1500米。也分布于印度、缅甸、越南、老挝。

7. 扁鞘飘拂草 图版 XXVI, 1—5

图版 XXV 1—4. 武功山飘拂草 *Fimbristylis wukungshanensis* Tang et Wang, 1. 植株×1; 2. 小穗×4; 3. 鳞片×20; 4. 小坚果×20。 5—9. 东南飘拂草 *F. pierotii* Miq., 5. 匍匐根状茎×1; 6. 辐射枝×1; 7. 鳞片×10; 8. 小坚果×10; 9. 花柱和柱头×10。 10—13. 无叶飘拂草 *F. aphylla* Steud., 10. 小穗×4; 11. 鳞片×20; 12. 小坚果×20; 13. 花柱和柱头×20。 14. 起絨飘拂草 *F. dipsacea* (Rottb.) Benth. 的小坚果×20 (抄自 C. B. Clarke "Illustrations of Cyperaceae" Tab. XLI, 6)

