

毛,柱头3。小坚果宽倒卵形,三棱形,长0.75毫米,具不明显的疣状突起,表面网纹呈方形或横长圆形,或有时近于平滑,成熟时紫黑色。

产于我国台湾;日本琉球群岛、印度尼西亚爪哇和澳洲亦有分布。

10. 佛焰苞飘拂草 图版 XXVII, 1—7

Fimbristylis spathacea Roth, Nov. Sp. Pl. (1821) 24; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 244; Matsum. et Hayata, Enum. Pl. Formos. (1906) 485——*Fimbristylis wightiana* Nees in Wight, Contrib. (1834) 99; Benth. Fl. Hongk. (1861) 392——*Fimbristylis formosensis* C. B. Clarke in Henry, List Pl. Formos. (1896) 105; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXIX (1911) 444——*Fimbristylis kankaoensis* Hayata, Ic. Pl. Formos. VI (1916) 111, f. 28.

根状茎短。秆几不丛生,高4—40厘米,钝三棱形,具槽,基部生叶,外面包着黑褐色、分裂为纤维状的枯老叶鞘。叶较秆短得多,宽1—3毫米,线形,顶端急尖,坚硬,平张,边缘略向里卷,有疏细齿,稍具光泽,鞘前面膜质,白色,鞘口斜裂,无叶舌。苞片1—3枚,直立,叶状,较花序短得多;长侧枝聚繖花序小,复出或多次复出,长1.5—2.5厘米,宽1—3厘米;辐射枝3—6个,钝三棱形,长3—15毫米;小穗单生,或2—3个簇生,卵形或长圆形,顶端钝,长3—5毫米,宽1.5—2.5毫米,密生多数花;鳞片宽卵形,顶端钝,膜质,长1.25毫米,锈色,有无色透明的宽边,背面有3—5条脉,有时只中脉呈显明的龙骨状突起;雄蕊3,花药狭长圆形,急尖,长约1毫米,为花丝长的1/2;子房长圆形,基部稍狭,花柱略扁,无缘毛,柱头2,很少3个,长约与花柱等。小坚果倒卵形或宽倒卵形,双凸状,紫黑色,长1毫米。花果期7—10月。

产于广东、海南岛、广西、福建、台湾;生在河滩石砾间和海边砂中,海拔0—350米。非洲、锡兰、印度、马来亚、越南、泰国、日本亦见分布。

11. 絹毛飘拂草 图版 XXVII, 13—17

Fimbristylis sericea (Poir.) R. Br. Prodr. (1810) 228; Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 299; 侯宽昭等, 广州植物志 (1956) 752; Ohwi et Koyama in Bull. Nat. Sci. Mus. N. S. III (1958) 29——*Scirpus sericeus* Poir. Encycl. Suppl. V (1804) 99——*Fimbristylis decoras* Nees et Meyen in Wight, Contrib. (1834) 101.

根状茎很长,斜升或平行,分枝,外面包着黑褐色枯老的叶鞘,鞘常分裂为纤维状,长达10厘米。秆散生,高15—30厘米,钝三棱形,被白色绢毛,基部生叶。叶平

