

的疣状突起。 花果期 8—10 月間。

产于广东海南、云南、四川；生长于沼地或浅水处，海拔 800 米左右。 分布于越南、尼泊尔、緬甸、印度、錫兰、馬來亞。

两广球穗飘拂草(变种)

var. **austro-japonica** Ohwi, Cyper. Jap. II in Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. Ser. B. XVIII (1944) 71.

秆矮而細，高 17—40 厘米，基部以上直径 1—1.5 毫米。叶如存在，寬約 1 毫米。鱗片淡棕色。 花果期 8—10 月。

产于江苏、江西、广西、广东、海南島；生长于沼地或浅水处。也分布于日本琉球羣島。

組2. 二柱头組 Sect. *Dichelostylis* Benth. Fl. Austr. VII (1874) 309.

具根状茎或不显著或无，少具匍匐根状茎。秆丛生或疏丛生。叶存在。花序一般为长侧枝聚繖花序，有多数小穗，少有 1—3 个；鱗片頂端的短尖一般直出，很少外弯；花柱扁，上部有緣毛，柱头 2。小坚果倒卵形，褐色，很少黑色。

系6. 两歧飘拂草系 Ser. *Dichotomae* Ohwi, Cyper. Jap. II in Mem. Coll. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. B. XVIII (1944) 55.

具根状茎或不显著，少有具匍匐根状茎；秆基部不具无叶片的鞘。长侧枝聚繖花序有多数小穗；小穗一般卵形，少有长圓形或橢圓形；鱗片有 3 至多条脉。小坚果褐色，有橫长圓形或六角形网紋。

18. 两歧飘拂草 图版 XXX, 1—5

Fimbristylis dichotoma (Linn.) Vahl, Enum. Pl. II (1806) 287; excl. var. *villosa*; Hance in Journ. Bot. XVI (1878) 112; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 233; Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 299; C. E. C. Fiescher in Kew Bull. (1935) 150—*Scirpus dichotomus* Linn. Sp. Pl. ed. 1 (1753) 50—*Scirpus annuus* All. Fl. Pedem. II (1785) 277, t. 88, fig. 5—*Scirpus diphyllus* Retz. Observ. V (1789) 15—*Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl, Enum. Pl. II (1806) 289; Benth. Fl. Hongk. (1861) 392; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 233; Matsum. et Hayata, Enum. Pl. Formos. (1906) 483; Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 299; Diels in Engl. Bot. Jahrb. XXIX (1900) 299—*Fimbristylis annua* (All.) Roem. et Schult. Syst. II (1817) 95; Kükenth. in

Fedde, Rep. Nov. Sp. Beih. XII (1922) 30 et in Act. Hort. Gotob. V (1929) 109, incl. var. *diphylla* (Retz.) Kükenth.; Hand.-Mzt. Symb. Sin. VII (1936) 1251; 侯寬昭等, 广州植物志 (1956) 754—*Fimbristylis tikushiensis* Hayata, Ic. Fl. Formos. VI (1916) 113.

form. **dichotoma**

稈丛生, 高 15—50 厘米, 无毛或被疏柔毛。叶綫形, 略短于稈或与稈等长, 寬 1—2.5 毫米, 被柔毛或无, 頂端急尖或鈍; 鞘革質, 上端近于截形, 膜質部分較寬而呈淺棕色。苞片 3—4 枚, 叶状, 通常有 1—2 枚长于花序, 无毛或被毛; 长側枝聚繖花序复出, 少有簡單, 疏散或緊密; 小穗单生于輻射枝頂端, 卵形、橢圓形或长圓形, 长 4—12 毫米, 寬約 2.5 毫米, 具多数花; 鱗片卵形、长圓状卵形或长圓形, 长 2—2.5 毫米, 褐色, 有光泽, 脉 3—5 条, 中脉頂端延伸成短尖; 雄蕊 1—2 个, 花絲較短; 花柱扁平, 长于雄蕊, 上部有緣毛, 柱头 2。小坚果寬倒卵形, 双凸状, 長約 1 毫米, 具 7—9 显著縱肋, 网紋近似橫长圓形, 无疣状突起, 具褐色的柄。 花果期 7—10 月。

产于云南、四川、广东、广西、福建、台湾、貴州、江苏、江西、浙江、河北、山东、山西、东北各省等广大地区; 生长于稻田或空曠草地上。 分布于印度、中印半島、澳洲、非洲等地。

矮两歧飘拂草(变型)

form. **depauperata** (C. B. Clarke) Ohwi, Cyper. Jap. II in Mem. Coll. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. B. XVIII (1944) 81—*Fimbristylis diphylla* (Retz.) Vahl var. *depauperata* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 637.

植株各部极为纤细。稈高 5—17 厘米。叶刚毛状, 有时較稈为长。小穗单个頂生, 或由 2—3 小穗組成聚繖花序。

产于辽宁、湖南、河北; 生长在沼泽浅水处。印度、日本也有分布。

綫叶两歧飘拂草(变型)

form. **annua** (All.) Ohwi, Cyper. Jap. II in Mem. Coll. Sci., Kyoto Imp. Univ. Ser. B. XVIII (1944) 81—*Scirpus annuus* All. Fl. Pedem. II (1785) 277, t. 88, f. 5—*Fimbristylis annua* (All.) Roem. e Schult. Syst. II (1817) 95—*F. diphylla* (Retz.) Vahl var. *annua* (All.) C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 637.

植株各部較为纤细。 稈高 5—25 厘米。 叶狭綫形, 較稈为短, 寬 0.5—2 毫米。长側枝聚繖花序簡單, 小穗較少, 常为 1—7 个。

