

产于辽宁、山东、河北、江西、湖南、云南、贵州；生长在田中或浅水处。

19. 拟两歧飘拂草

Fimbristylis dichotomoides Tang et Wang, sp. nov.

稈丛生，高 20—100 厘米，被长柔毛。叶长约爲稈的 2/3，寬 2 毫米，两面被长柔毛，頂端急尖。苞片叶状，2—3 枚，通常短于花序，被长柔毛；长側枝聚繖花序复出或多次复出，有多数輻射枝；小穗单生于輻射枝頂端，长圓状卵形或卵形，长 7—12 毫米，寬 2.5—3 毫米，最下面 1—3 个鱗片內无花；有花鱗片长圓状椭圆形，浅棕色，长约 3 毫米，有 3—7 条脉，中脉延伸成短尖；雄蕊 3；花柱扁平，上部有緣毛，基部稍寬，柱头 2。小坚果寬倒卵形，双凸状，长约 1 毫米，乳白色，具褐色短柄，表面有近似六角形网紋，略具纵肋及稀疏的疣状突起，有时不甚明显。 花果期 7 月。

产于广西、广东等省区；生长在山坡草地上。

20. 长穗飘拂草 图版 XXIX, 5—8

Fimbristylis longispica Steud. Synops. II (1855) 118; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 239; Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 299—*Fimbristylis dietrichseni* Böckl. in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) 505 et in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXIX (1911) 450; Ohwi et Koyama in Bull. Nat. Sci. Mus. N. S. III (1956) 29.

根状茎短；稈丛生，高 25—60 厘米。叶短于稈，近于无毛，寬 1.5—2.5 毫米，邊緣常內捲，頂端鈍。苞片 2—3 枚，叶状，最下面一个通常較花序为长，頂端鈍；长側枝聚繖花序复出、多次复出或简单，有 3—6 个輻射枝；小穗单生于輻射枝頂端，狭长圓形、长圓形或长圓状卵形，长 6—20 毫米，頂端急尖或鈍圓；鱗片寬卵形，舟状，长约 3 毫米，有 3—5 条棕色或浅棕色脉，无毛，頂端具短尖；雄蕊 3；花柱略长于小坚果，上部有緣毛，基部稍寬，柱头 2。小坚果圓倒卵形，双凸状，长 1.2—1.5 毫米，浅棕色，无柄，具六角形网紋，无纵肋和疣状突起。 花果期 8—9 月。

产于东北各省、山东、江苏、浙江、福建；生长在海边或坡脚湿地。分布于馬來亚、日本、越南。

21. 結壮飘拂草 图版 XXIX, 9—12

Fimbristylis rigidula Nees in Wight Contrib. Bot. Ind. (1834) 99; Hance in Journ. Linn. Soc. Bot. XIII (1873) 131; Diels in Engl. Bot. Jahrb. XXIX (1901) 292; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 242; Pampanini in Nuov. Giorn. Bot. Ital. N. S. XVII (1910) 235; Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk.

