

系7. 锈鳞飘拂草系 Ser. Ferrugineae Tang et Wang. ser. nov.

具根状茎,无匍匐根状茎;秆基部具无叶片的鞘。鳞片具1条脉。小坚果近于光滑,褐色。

23. 锈鳞飘拂草 图版 XXIX, 1—4

Fimbristylis ferrugineae (Linn.) Vahl, Enum. II (1806) 291; Benth. Fl. Hongk. (1861) 391; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 235; Matsum. et Hayata, Enum. Pl. Formos. (1906) 483; Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 299; Bailey, Gentes Herb. I (1920) 13; Kükenth. in Fedde Repert. Nov. Sp. Beih. XII (1922) 309 — *Scirpus ferrugineus* Linn. Sp. Pl. ed. 1 (1753) 50 — *Fimbristylis aginkotensis* Hayata, Ic. Pl. Formos. VI (1916) 108 — *Fimbristylis anpinensis* Hayata, l. c.

var. **ferrugineae**

根状茎短,木质,水平生长。秆丛生,细而坚挺,高20—65厘米,扁三棱形,平滑,灰绿色,基部稍膨大,具少数叶。下部的叶仅具叶鞘,而无叶片,鞘灰褐色,上部的叶常对折,线形,顶端钝,长仅为秆的1/3或有时更短些,宽约1毫米。苞片2—3枚,线形,短于或稍长于花序,近于直立,基部稍扩大;长侧枝聚繖花序简单,少有近于复出,具少数辐射枝;辐射枝短,最长不及1厘米;小穗单生于辐射枝顶端,长圆状卵形、长圆形或长圆状披针形,顶端急尖,少有钝的,圆柱状,长7—15毫米,宽约3毫米,具多数密生的花;鳞片近于膜质,卵形或椭圆形,顶端钝,具短尖,长3—4毫米,灰褐色,中部具深棕色条纹,背面具1条明显的中肋,上部被灰白色短柔毛,边缘具缘毛;雄蕊3,花药线形,药隔稍突出于花药顶端;花柱长而扁平,基部稍宽,具缘毛,柱头2。小坚果倒卵形或宽倒卵形,扁双凸状,长1—1.5毫米,表面近于平滑,成熟时棕色或黑棕色,有很短的柄。 花果期6—8月。

产于福建、台湾、广东、海南岛;生长在海边或盐沼地里。 分布于印度、日本琉球群岛、以及全世界温暖地区的沿海地方。

弱锈鳞飘拂草(变种)

var. **sieboldii** (Miq.) Ohwi in Journ. Jap. Bot. XIV (1938), 576; Ohwi et Koyama in Bull. Nat. Sci. Mus. N. S. III (1956) 29 — *Fimbristylis sieboldii* Miq. Cat. Mus. Bot. Lugd.-Bat. (1870) 118, nom. nud.; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 151.

秆矮,高10—30厘米,较细弱。长侧枝聚繖花序通常只有1—2个小穗,间有3个

