

穗; 輻射枝无毛, 纤细; 小穗单生于輻射枝頂端, 披針形, 稍扁, 长约 5 毫米, 宽 1 毫米, 只有 2—3 朵花; 鱗片卵状披針形或披針形, 頂端漸尖, 长约 3 毫米, 膜質, 具锈色細点, 有 2—3 条脉, 中脉稍呈龙骨状隆起; 雄蕊 3; 子房圓筒状略帶三稜形, 白色; 花柱很长, 約为子房的 6—8 倍, 三稜形, 基部稍膨大; 柱头 3, 常捲曲。 花果期 7 月。

产于广西; 生长在草地或山坡上。

42. 暗褐飘拂草 片角草(海南島) 图版 XXXV, 15—18

Fimbristylis fusca (Nees) Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. III (1883) 1048; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 236; Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 299; 侯寬昭等, 广州植物誌 (1956) 751—*Abildgaardia fusca* Nees in Wight, Contrib. Bot. Ind. (1834) 95; Benth. Fl. Hongk. (1861) 390—*Fimbristylis cinnamometorum* Hance in Journ. Linn. Soc. Bot. XIII (1873) 132 non Kunth.

var. *fusca*

无根状茎。稈丛生, 高 20—40 厘米, 具根生叶。叶綫形, 两面被毛, 长 5—15 厘米, 宽 1—3 毫米, 頂端急尖。苞片 2—4 枚, 叶状, 长 8—35 毫米, 被毛, 基部甚宽, 向頂端漸狭, 頂端具短尖。长側枝聚繖花序复出, 有多数被毛的輻射枝; 小穗单生于輻射枝頂端, 披針形或长圓状披針形, 长 6—10 毫米, 上端漸狭, 最下面的 2—3 片鱗片内无花; 有花鱗片厚紙質, 卵状披針形, 頂端有硬尖, 长 4—5 毫米, 被粗糙短毛, 棕色或近似黑棕色, 有时边缘膜質, 白色, 中脉 1 条, 略隆起; 雄蕊 3; 花柱长 4—5 毫米, 基部膨大, 柱头 3。小坚果倒卵形, 三稜形, 几无柄, 长约 0.9 毫米, 淡棕色或白色, 有疣状突起。 花果期 6—9 月。

产于广东、海南島、福建、台湾、广西、湖南; 生长在山頂、草坡、草地、田中, 海拔 100—230 米; 常和知风飘拂草 *Fimbristylis eragrostis* Hance 混生。分布于馬來亚、印度、泰国、越南、緬甸及喜馬拉雅山区。

广州暗褐飘拂草(变种)

var *contoniensis* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 237. 叶长 15—35 厘米, 通常超过稈的一半, 少数与稈等长。

43. 矮飘拂草

Fimbristylis nanofusca Tang et Wang, sp. nov.

稈丛生, 高 5—13 厘米。基生叶綫形, 稍弯, 长约 1/2 强, 宽 1—1.5 毫米, 有緣毛, 頂端急尖。苞片 2 枚以上, 叶状, 长 5—18 毫米, 宽不到 1 毫米, 頂端漸尖, 秒

