

短硬毛,长侧枝聚繖花序简单,少数近于复出,辐射枝长1—3厘米,被毛;小穗单生于辐射枝顶端,卵形或短卵形,稍扁,长4—5毫米,宽约1.5毫米,最下面的1—3片鳞片内无花;鳞片卵形,膜质,长2.5—3毫米,棕色,无锈色细点,被短硬毛,背面具1条中脉呈龙骨状隆起且伸出于鳞片顶端呈短尖,无花鳞片稍短,并有略长的芒;雄蕊3;子房圆筒状,三棱形,白色,花柱长约2毫米,基部膨大,浅棕色,柱头3。小坚果三棱状倒卵形,基部截形,具很短的柄,淡黄色或近于白色,有多数疣状突起。花果期8月。

产于浙江;生长在山坡上。

系 17. 华飘拂草系 *Ser. Chinenses* Tang et Wang, ser. nov.

具叶或无叶。小穗1—12个,簇生成头状;柱头3。小坚果不详。

44. 滇飘拂草 图版 XXXV, 19—21

Fimbristylis yunnanensis C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 247.

植株具匍匐茎。秆细弱,高12—50厘米。叶长约为秆的 $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$,宽1—1.5毫米,被稀疏的糙伏毛,顶端急尖。苞片2—3枚,叶状或近于刚毛状,长5—27毫米,高于花序,被糙伏毛;头状花序直径8—12毫米,有3—7(—12)个小穗;小穗卵状披针形,长5—7毫米,有7—8片鳞片,下部鳞片为二列,最下面的4—5片鳞片内无花;鳞片卵状披针形,舟状,厚纸质,红褐色,上半部被短硬毛,最下面的鳞片顶端具由中脉延伸的短尖;雄蕊3;花柱三棱形,基部膨大,无缘毛,柱头3。小坚果倒卵形,钝三棱形,长为鳞片的 $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$,白色,网纹不明显。花果期6月。

产于云南;生长在山坡上。分布于泰国、越南。

45. 华飘拂草 图版 XXXV, 1—11

Fimbristylis chinensis (Benth.) Tang et Wang, comb. nov. — *Arthrostylis chinensis* Benth. Fl. Hongk. (1861) 397; Hance in Journ. Linn. Soc. Bot. XIII (1873) 133 — *Actinoschoenus chinensis* Benth. apud Hook. f. Ic. Pl. (1881) 33, sub t. 1346 in nota. — *Fimbristylis actinoschoenus* C. B. Clarke var. *chinensis* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 651 et in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 230 — *Fimbristylis actinoschoenus* Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 298, non C. B. Clarke — *Fimbristylis thouarsii* Merr. et Chun in Sunyats. V (1940) 23 non Merr.

秆丛生,三棱形,高15—40厘米,纤细,基部有2个鞘。鞘无叶片,棕色,具隆起肋

