

基;花柱基钻状圆锥形,稍扁,长5.5毫米,基部与小坚果等宽,两面沿中綫各有1条浅槽。 花果期3—12月。

产于广东、海南島、台湾及云南;生长在溪旁或山谷湿草地中;海拔120—900米。分布于全球热带及亚热带地区。

組 2. 白喙刺子莞組 Sect. *Glaucæ* C. B. Clarke in Kew Bull. Add. Ser. VIII (1908) 120.

下位刚毛6条以下,被顺刺或倒刺;鳞片褐棕色。

2. 白喙刺子莞 图版 XXXVI, 4—5

Rhynchospora brownii Roem. et Schult., Syst. II (1817) 86; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 20 —— *Rhynchospora glauca* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 259, non Vahl; Hayata, Ic. Pl. Formos. VI (1916) 116.

根状茎极短。秆丛生,直立,纤细,高30—50厘米,少有达90厘米,三棱形,平滑,无毛,顶部通常粗糙。叶鞘闭合,长2.6—6厘米,无毛,具多条纵肋,鞘口具极短叶舌;叶多数基生,秆生叶少而疏,狭线形,三棱形,较秆短,宽1.5—3毫米,顶端渐尖,边缘微粗糙。苞片叶状,下面的具鞘,最上的不具鞘;圆锥花序由顶生和侧生繖房状长侧枝聚繖花序所组成,具多数小穗,顶生枝花序复出,松散;小苞片刚毛状;小穗椭圆形或近卵形,长4.5毫米,基部稍钝,顶端急尖,锈棕色,具7—8片鳞片,有花3—4朵,最下部的3—4片鳞片中空无花;无花鳞片椭圆状卵形,较有花鳞片为短而小;有花鳞片3,较大,宽卵形,最上的1片鳞片内无花或极不发达,其下通常为3朵两性花,其中最上1朵雌蕊极不发达;所有鳞片沿中脉突起,顶端具短尖或急尖;下位刚毛6条,长短不一,具顺刺;雄蕊3,罕2—1个,花丝较成熟小坚果和花柱基为长;子房倒卵形,花柱细长,柱头2,与花柱等长。小坚果宽椭圆状倒卵形,淡锈色,长1.7毫米,双凸状,具较深色的横皱纹,顶端具宿存的花柱基(喙);花柱基较小坚果短,广圆锥形,基部稍狭于小坚果,顶端急尖,表面被白色粉状物。 花果期6—10月。

产于福建、台湾、广东、广西、湖南及云南;生长沼泽或河边潮湿的地方;海拔1000—2400米。分布于全球热带及亚热带地区。

3. 华刺子莞 图版 XXXVI, 6—7

Rhynchospora chinensis Nees et Mey. in Wight, Contrib. (1834) 115, pro parte; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 18; E.-C. Camus in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine VII (1912) 148 —— *Rhynchospora luxa* Benth. Fl. Hongk. (1861) 397, non R. Br. —— *Rhynchospora glauca* Vahl var. *chinensis* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit.

