

被微柔毛。小坚果长圆状卵形,长约2.5毫米,褐色,光亮,喙极不明显。 花果期约5月。

产于我国广西和云南,据 C. B. Clarke 記載,产广东;又据 J. Ohwi 記載,台湾亦产;此外,亦分布于朝鲜、日本及其琉球羣島和小笠原羣島。

亚属 2. 尖喙莎亚属 Subgen. *Baumea* Gaud. in Freycinet, Voy. Bot. (1826) 416, t. 29.

秆高大,圆柱状。叶圆柱状。圆锥花序;小穗通常聚集成球形。小坚果具喙。

2. 毛喙克拉莎

Cladium nipponense Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 11——*Cladium glomeratum* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1894) 675 et in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. XIV (1904) 200, non R. Br.

根据 C. B. Clarke 和 Ohwi 本种产于中国、日本及其琉球羣島等地,也分布于新加坡。但我们未见到标本。其与 *C. myriathum* 之不同,主要在秆和叶均为圆柱状,叶较狭,宽2—3毫米。小坚果长圆形,较长,长约3毫米,顶端具灰色长柔毛。

3. 多花克拉莎 图版 XXXVIII, 1—4

Cladium myrianthum Chun et How in Acta Phytotax. Sin. VII (1958) 83, t. 26, f. 1.

粗壮草本,根状茎极短,须根粗。秆高约2米,扁,有节。叶基生和秆生,革质,剑形,鳶尾叶状,长达150厘米,宽18—22毫米,向顶端渐狭,二列,套摺,顶端短渐尖,无中脉,具多数纵脉和小横脉,全缘,平滑。苞片叶状,具鞘,渐向顶端渐小,鞘渐短;圆锥花序由数个多次复出聚繖花序所组成,硕大而疏展,长40—60厘米,分枝和小枝扁,1至数枝从同一苞片鞘内抽出;小穗2—4个簇生成小头状,长约5毫米,有花2—4朵,仅最下面的1—2朵结实;鳞片褐色,长方形,对摺,最下面的长约4毫米,顶端稍钝,被微柔毛,边缘膜质,具缘毛,背面具龙骨状突起;下位刚毛4—6条,褐色,短于花柱;雄蕊3,花丝扁平,长3.5—4毫米,无毛,花药早落;花柱长约4毫米,由上而下渐膨大,中部以下或至基部被白色毡毛状的毛,柱头3—2个。小坚果倒卵形,锐三棱形,长约1毫米,无毛,褐色,具喙。 花果期8—9月。

仅产于广东海南島(銅甲至文化間及保亭县);生长河边及林中,海拔900—1700米。

4. 剑叶克拉莎

Cladium ensigerum Hance in Journ. Bot. XXIII (1885) 80.