

根据 Hance 的記載, 本种产于香港; 但我們未見到标本, 其与 *C. myrianthum* Chun et How 相近, 但叶較短, 最长达 50 厘米, 邊緣具小而粗糙的小齿。小穗較长, 长 10—12 毫米。

11. 鳞籽莎属——*Lepidosperma* Labill.

Labill. Pl. Nov. Holl. I (1804) 14, t. 11.

多年生草本, 丛生, 匍匐根状莖粗壮, 刚硬, 无毛。稈圓柱状, 直立, 粗壮。叶基生, 有叶鞘, 叶片圓柱状。圓錐花序具多数小穗; 小穗密聚, 具 5—10 片鱗片, 最下面的数片鱗片中空无花, 上面有 2—3 朵花, 通常全部花均能結实, 罕仅 1 朵花結实, 最下面的 1 朵花, 通常具不完全的雌、雄蕊; 下位鱗片 6 枚, 罕 3 枚; 雄蕊 3; 花柱細长, 基部无毛或近无毛, 柱头 3, 細长。小坚果三棱形, 平滑, 无喙, 基部通常为硬化的鱗片所包。

本属約 50 余种, 主要分布于澳洲, 新西兰和亚洲热带地区, 我国有 1 种。

1. 鳞籽莎 辣死鸡草(广东)。

Lepidosperma chinense Nees in Linnaea IX (1834) 302; Kunth, Enum. Pl. II (1837) 320; Benth. Fl. Hongk. (1861) 398; C. B. Clarke in Hook.f. Fl. Brit. Ind. VI (1894) 676.

多年生草本, 具匍匐根状莖和須根。稈丛生, 高 45—90 厘米, 圓柱状或近圓柱状, 直立, 坚挺, 基部被枯萎的叶鞘; 叶鞘紫黑色、淡紫黑色或麦稈黄色, 长 3—8 厘米, 开裂, 邊緣膜質, 叶舌不甚显著。叶圓柱状, 基生, 較稈稍短, 直径 2—3 毫米, 平滑, 坚挺, 无毛。苞片具鞘, 圓柱状或半圓柱状, 与鞘等长或稍长, 頂端稍扁, 急尖或鈍, 无毛; 圓錐花序紧縮成穗状, 长 3—10 厘米; 小穗密集, 紡錘状長圓形, 长 6—8 毫米, 具 5 片鱗片, 有 1—2 朵花; 鱗片卵形或卵状披針形, 长 4—6.5 毫米, 頂端鈍, 具短尖, 背面龙骨状突起粗糙, 表面略被白粉, 最下面的 2 片鱗片中空无花, 其上面两鱗片內各具 1 朵两性花, 下面一朵雌蕊不发育, 或有时下面 1 鱗片內无花, 最上面的鱗片不发达; 下位鱗片 6 枚, 很短; 雄蕊 3, 花絲較花药长 1 倍半, 花药綫形, 頂端药隔突出; 花柱細长, 柱头 3, 較花柱稍短。小坚果橢圓形, 长 3.5—4 毫米, 褐黄色, 平滑, 有光泽, 无喙, 基部为硬化的鱗片所包。花果期 7—12 月, 有时在 5 月抽穗。

产于福建、湖南、广东; 生长于山边、山谷疏蔭下、湿地和溪边; 海拔 800—1500

图版 XXXVIII 1—4 多花克拉莎 *Cladium myrianthum* Chun et How. 1. 植株的一部 × 1; 2. 花序 × 1; 3. 小穗 × 6, 4. 小坚果 × 10。