

13. 海滨莎属——*Remirea* Aubl.

Aubl. Hist. Pl. Guian. Franc. I (1775) 44, t. 16——*Miegia* Schreber,

Gen. II (1791) 786.

多年生草本，矮小；匍匐或斜升的根状茎长，常从某些节上长出稈。稈矮，具鈍稜和多数条紋。叶多数，密生成丛，綫形，坚挺。苞片叶状；穗状花序 2 至少数簇生，无柄，着生于稈的頂端；小穗基部的小苞片鱗片状，比小穗短；小穗小，无柄，具 4 鱗片；鱗片近两行排列，最下面 3 鱗片中空无花，具脉，最上面鱗片厚而肉質，无脉，具 1 朵两性花；无下位刚毛；雄蕊 3，花药綫状长圓形和綫形，药隔頂端伸出药外成細尖；子房三棱形，柱头 3。小坚果长橢圓形，三棱形，无喙。

单种属，广布于全球热带地区的海边；我国亦見分布。

1. 海滨莎 图版 XL, 1—9

Remirea maritima Aubl. Hist. Pl. Guian. Franc. I (1775) 45, t. 16; Kunth, Enum. II (1837) 139; Böckl. in Linnaea XXXVI (1870) 435; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 677 et in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 258; Merr. Enum. Philipp. Fl. Pl. I (1922) 130; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 24; 侯寬昭等，广州植物志 (1956) 762 —— *Miegia maritima* (Aubl.) Willd. Sp. Pl. I (1798) 311.

稈高 6—13 毫米，有纵槽，几三棱形，无毛。叶革質，披針形，通常长于稈，寬 4.5—6.5 毫米，叶面中脉下凹，在背面隆起，叶鞘膜質，棕色。苞片叶状，长于花序；穗状花序通常 2—7 个成簇，着生于稈的頂端，无柄，长圓状橢圓形或卵状长圓形，长 1—2 厘米，寬 7—10 毫米，具多数小穗；小穗密聚，紡錘状橢圓形，长约 5 毫米，小穗基部的小苞片鱗片状，卵状披針形，頂端急尖，长 3 毫米左右，有棕色条紋，具 1 条脉；第一鱗片寬卵形，长约 2 毫米，頂端鈍圓，具 2 条脉及棕色条紋；第二鱗片卵形，长约 4 毫米，頂端鈍圓，約有 7 条脉；第三鱗片仅較第二鱗片稍长，上述鱗片內均无花；第四鱗片肉質，长约 3 毫米，向內捲，无脉，有棕色小斑点，頂端細尖，具 1 朵两性花；雄蕊 3；子房长圓形，三棱形，花柱短，柱头 3，細长，长为花柱的 3—4 倍。小坚果圓筒状长橢圓形，长约 2 毫米，黑棕色，扁三棱形，无柄，无毛，表面細胞小，近圓形，有小突起。花果期 9—12 月。

产于广东海南島和台湾海边，根据 C. B. Clarke 記載，广州亦有；并分布于全球热带海边。