

邊緣具白色透明的边,具3条不很明显的脉;雄蕊2,有时1枚,花药椭圆形,药隔不突出于花药顶端;花柱极短,柱头3,短。小坚果倒卵状椭圆形,三棱形,几与鳞片等长,淡黄色。花果期7—10月。

在我国分布很广,东北各省、河北、山西、陕西、甘肃、云南、四川、湖南、湖北、浙江、江苏、安徽、福建、广东、广西、海南岛均常见到;常生长于稻田中或水边潮湿处。分布于苏联、日本、朝鲜、印度、喜马拉雅山区、非洲、中美。

組 13. 窄穗莎草組 Sect. *Haspani* Kunth, Enum. Pl. II (1837) 34.

多年生草本,罕一年生,多年生者根状茎短缩或延长成匍匐根状茎。秆基部有时具长鞘而无叶片,有时具少数叶。长侧枝聚繖花序复出或多次复出或简单;小穗3—7个指状排列,压扁;小穗轴无翅;鳞片精密或稍疏的复瓦状排列,膜质,背面具绿色龙骨状突起,两侧具槽,顶端具短尖;雄蕊3;罕2—1个,花药顶端具刚毛状附属物;花柱长,柱头3,细长。小坚果小,长为鳞片的 $1/4$ — $1/3$ 。

29. 窄穗莎草 图版 LII, 1—6

Cyperus tenuispica Steud. Synops. Cyper. (1855) 11; Kükenth. in Engl. Pflanzenr. Heft 101, IV, 20 (1936) 245; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 145—*Cyperus flavidus* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XX (1883) 287, non Retz.; Hayata, Enum. Pl. Formos. (1906) 472.

具须根。秆丛生,细弱,高3—27厘米,扁三棱形,平滑,基部具少数叶。叶短于秆,宽2—3毫米,平张;叶鞘稍长。苞片通常2枚,叶状,其中一枚常长于花序;长侧枝聚繖花序复出或有时为简单,具4—8个辐射枝,最长辐射枝达7厘米;小穗3—12个呈指状排列,线形,长3—12毫米,宽约1毫米,具10—40朵花;小穗轴无翅;鳞片疏松排列,膜质,椭圆形,顶端钝或近于截形,长不及1毫米,背面中间黄绿色,两侧深褐色,脉不明显;雄蕊1或2,花药线形,顶端无刚毛状附属物;花柱长,柱头3。小坚果极小,长仅0.25毫米,倒卵形,淡黄色,表面有小疣状突起,具光泽。花果期9—11月。

产于湖南、贵州、广西;多生长于空旷的田野里或疏林下。此外亦产于非洲、印度、马来亚、印度尼西亚、越南、朝鲜、日本。

30. 畦畔莎草 图版 LII, 7—12

Cyperus haspan Linn., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 45; Benth. Fl. Hongk. (1861) 386; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 213 et in Bull. Int. Acad. Géogr. Bot. XVI (1906) 59; Corutois in Belval, Fl. Ngan-hoei (1906—22)

