

急尖,长约3毫米,黑褐色,稍有光泽,背面具3条脉,麦稈黄色,两侧无脉;雄蕊3,花药线形;花柱较短,柱头2,细长。小坚果长圆状倒卵形,顶端具短尖,双凸状,长约鳞片1/2,黑色,表面具六角形网纹,网心突起呈密的细点。 花果期6月。

产于云南;生长于沼泽中。

2. 禾状扁莎 图版 LVIII, 1—4

Pycrus unioloides (R. Br.) Urb. Symb. Antill. II (1900) 164 — *Cyperus unioloides* R. Br. Prodr. (1810) 216; Kunth, Enum. II (1884) 60; Kükenth. in Engl. Pflanzenr. Heft 101, IV, 20 (1936) 338.

根状茎短。秆丛生,细长,坚挺,三棱形,平滑,基部具少数叶。叶短于秆,宽约3毫米,折合或平张,较硬;叶鞘长,红棕色。苞片叶状,通常2枚,下面1枚长于花序;简单长侧枝聚繖花序具2—6个辐射枝;辐射枝有时短缩,有时长可达5厘米;小穗3—9个排列成穗状,长圆状披针形或披针形,扁平,长8—18毫米,宽3—4.5毫米,具10—22朵花;小穗轴多次迴折,无翅;鳞片近于革质,卵形,顶端急尖,长约4毫米,背面具3条脉,绿色,两侧无脉,呈麦稈黄色或有时为黄褐色;雄蕊3,花药线形,红棕色,药隔稍突出;花柱长,柱头2。小坚果宽倒卵形,扁双凸状,长约鳞片1/4—1/3,初期黄白色,后呈黑色,表面具密的突起细点。 花期6—7月。

产于云南(昆明市);生长于山谷溪旁潮湿处。也分布于伊里安岛,印度、缅甸、越南、菲律宾、日本、非洲、澳洲以及美洲。

3. 浙江扁莎 图版 LVIII, 5—6

Pycrus chekiangensis Tang et Wang, sp. nov.

根状茎短,具细长须根。秆高52—60厘米,纤细,三棱形,平滑,基部叶少。叶短于秆,宽约4毫米,常折合,有时平张;叶鞘长,褐红色。苞片3枚,叶状,下面2枚较花序长;简单长侧枝聚繖花序具3—4个辐射枝,辐射枝最长达6厘米;每一辐射枝具4—9个小穗;小穗排列疏松,两侧小穗平展,椭圆形或长圆状卵形,压扁,长6—10毫米,宽3.5—5毫米,具6—12朵花;小穗轴呈多次迴折,四棱形,无翅;鳞片稍松的复瓦状排列,近于革质,卵形,顶端急尖,长4—5毫米,背面龙骨状突起,绿色,具3条较粗的脉,两侧无脉,麦稈黄色,有时稍带红棕色,具光泽;雄蕊3,花药线形,红棕色;花柱长,柱头2,细长。小坚果(不很成熟)倒卵形或椭圆形,双凸状,黄白色,表面具密的突起细点。 花期9月间。

产于我国浙江、台湾;生长在溪边潮湿的地方。

组 2. 球穗扁莎组 Sect. Globosi C. B. Clarke in Kew Bull. Add. Ser. VIII

