

产于广西、广东海南島；生长在林下或沙土上。也分布于印度、馬來亞、菲律賓以及越南。

7. 多枝扁莎 細样席草(海南島)

Pycnus polystachyus (Rottb.) P. Beauv. Fl. Oware II (1807) 48; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 592 et in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 205; Matsum. et Hayata, Enum. Pl. Formos. (1906) 469 — *Cyperus polystachyus* Rottb. Descr. et Ic. (1773) 39, t. 11, f. 1; Kunth, Enum. II (1837) 13; Benth. Fl. Hongk. (1861) 385; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XX (1883) 280 et XXI (1884) 51, t. 3, f. 27; Kom. Fl. Mansh. I (1901) 333; Kükenth. in Engl. Pflanzenr. Heft 101, IV, 20 (1936) 367; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 156; 侯寬昭等, 广州植物誌 (1956) 745.

var. ***polystachyus***

根状茎短,具許多須根。稈密丛生,高15—60厘米,扁三棱形,坚挺,平滑。叶短于稈,寬2—4毫米,平张,或有时折合,稍硬。苞片4—6枚,叶状,长于花序;复出长侧枝聚繖花序具多数輻射枝,輻射枝有时短缩,有时延长达3.5厘米,具多数小穗;小穗排列紧密,近于直立,綫形,长7—18毫米,寬約1.5毫米,具10—30朵花,或有时更多;小穗軸多次迴折,具狭翅;鱗片密复瓦状排列,膜質,卵状长圓形,長約2毫米,背面具3条脉,綠色,兩側麦稈色或紅棕色,无脉,頂端有时具极短的短尖;雄蕊2,少1个,花药綫形,药隔紅褐色,突出于花药頂端;花柱长,柱头2,細长,露出于鱗片之外。小坚果近于长圓形或卵状长圓形,双凸状,长为鱗片的1/2,頂端具短尖,表面具微突的細点。花果期5—10月。

产于福建、台湾、广东、海南島；生长于稻田旁、山谷阴湿的沙土上或有时生长于盐沼泽边上。此外在印度、越南、朝鮮、日本亦广泛分布。

短穗多枝扁莎(变种)

var. ***brevispiculatus*** How, 侯寬昭等, 广州植物誌 (1956) 746。

长侧枝聚繖花序紧縮成头状,輻射枝极短或近于无;小穗多数,密集,較短,長仅4—7毫米,具6—14朵花。花果期1—7月。

产于广东;生长于密蔭潮湿沙土上。

組 4. 矮扁莎組 Sect. *Pumili* (Kükenth.) L. K. Dai, comb. nov. — *Cyperus* Linn. subgen. *Pycnus* (P. Beauv.) C. B. Clarke pars *Isometrici* Kükenth. sect. *Pumili* Kükenth. in Engl. Pflanzenr. Heft 101, IV, 20 (1936) 375.