

大密穗磚子苗(变种)

var. **macrostachys** (Böckl.) How, 侯寬昭等, 广州植物誌 (1956) 747 ——
Cyperus dilutus Vahl var. *macrostachys* Böckl. in Linnaea XXXVI (1870) 355 ——
Cyperus compactus Retz. var. γ . *macrostachys* (Böckl.) Kükenth. in Engl. Pflanzenr.
 Heft 101, IV, 20 (1935) 424.

穗状花序半球形, 寬 2.5—3.5 厘米; 小穗长 12—18 毫米, 扁四棱形, 具 10—12 朵
 花。 果期 12 月。

产于广东、广西、海南島; 生长于空曠的田边。也分布于錫金、馬來亞。

組 2. 南洋磚子苗組 Sect. *Bancani* Tang et Wang, sect. nov.

多年生草本, 具短縮根状茎。秆高或矮。长側枝聚繖花序复出或多次复出, 少有
 短縮成头状; 輻射枝一面具槽; 穗状花序星状或头状; 小穗稍扁, 长圓形或长圓状披針
 形; 小穗軸无翅; 鱗片排列稀或密, 具龙骨状突起, 兩側紅色或淡灰褐色, 具多条脉。
 小坚果橢圓形或卵形。

2. 三翅稈磚子苗 图版 LIX, 6—8

Mariscus trialatus (Böckl.) Tang et Wang, comb. nov. — *Scirpus trialatus*
 Böckl. in Flora XLII (1859) 445 et in Linnaea XXXVI (1870) 721 — *Cyperus*
bancanus Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. I (1860) 599; E.-G. Camus in Lecomte, Fl. Gén.
 Indo-Chine VII (1912) 54 — *Cyperus diffusus* Vahl subsp. β . *bancanus* (Miq.)
 Kükenth. in Engl. Pflanzenr. Heft 101, IV, 20 (1935) 209 — *Cyperus turgidulus*
 C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXI (1884) 130, in Hook. f. Fl. Brit.
 Ind. VI (1893) 604 et Ill. Cyper. (1909) t. 13, f. 4—5 — *Cyperus diffusus* Vahl
 form. *turgidulus* Suringar, Het Gesl. Cyper. Mal. Archip. (1898) 100, t. 4, f. 17.

根状茎短, 木質。秆高 38—70 厘米, 扁銳三棱形, 各稜上具翅, 平滑, 下部具較多
 叶。叶短于秆或稍长于秆, 寬 8—10 毫米, 平张, 不粗糙。苞片 3—5 枚, 叶状, 下面
 2—3 枚长于花序, 向外展开; 长側枝聚繖花序复出, 或間有简单, 具 8—10 个第一次
 輻射枝; 輻射枝最长达 5.5 厘米, 每个第一次輻射枝上具 2—7 (—16) 个第二次輻射
 枝; 第二次輻射枝通常很短, 最长达 1.5 厘米; 小穗 5—18 个密集于輻射枝頂端呈球
 形头状花序, 卵形或长圓状卵形, 肿胀, 长 3—5.5 毫米, 寬 1.8—2.2 毫米, 具 6—10 朵
 花; 鱗片紧密地复瓦状排列, 膜質, 扁圓卵形, 頂端具外弯短尖, 很凹, 长 2—2.2 毫米,
 淡灰褐色, 背面龙骨状突起灰綠色, 具多数脉; 雄蕊 3, 花药短, 綫形; 花柱极短, 柱头
 3。小坚果卵形, 三棱形, 深棕色, 长约 1.8 毫米, 表面具密的微突細点。 花果期