

多年生,少有一年生草本。小穗具1—2朵花,多半只1花結果实:鱗片龙骨状突起上具翅,翅鸡冠状或只具刺状小齿。

5. 单穗水蜈蚣 图版 LXI, 5

Kyllinga monocephala Rottb. Descr. et Ic. (1773) 13, t. 4, f. 4, excl. synonym. nonnullis; Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. (1836) 224; Benth. Fl. Hongk. (1861) 388, p. p.; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 588, in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 244 et Ill. Cyper. (1909) t. 2, f. 1—2; Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. (1912) 296; E.-G. Camus in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine VII (1912) 25; Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. Philadelphia XXIV, 2 (1935) 87; 侯寬昭等, 广州植物志 (1956) 373 —— *Schoenus coloratus* Lour. Fl. Cochinch. (1790) 41, ed. Willd. (1793) 52 —— *Cyperus Kyllingia* Engl. Catal. Hort. Acad. Vindob. I (1842) 94; Kükenth. in Engl. Pflanzenr. Heft 101, IV, 20 (1935) 606.

多年生草本,具匍匐根状茎。秆散生或疏丛生,細弱,扁銳三棱形,基部不膨大。叶通常短于秆,寬2.5—4.5毫米,平张,柔弱,邊緣具疏鋸齿;叶鞘短,褐色,或具紫褐色斑点,最下面的叶鞘无叶片。苞片3—4枚,叶状,斜展,較花序长很多;穗状花序1个,少2—3个,圓卵形或球形,长5—9毫米,寬5—7毫米,具极多数小穗;小穗近于倒卵形或披針状长圓形,頂端漸尖,压扁,长2.5—3毫米,具1朵花;鱗片膜質,舟状,长同于小穗,蒼白色或麦秆黄色,具锈色斑点,兩側各具3—4条脉,背面龙骨状突起具翅,翅的下部狭,从中部至頂端較寬,且延伸出鱗片頂端呈稍外弯的短尖,翅邊緣具緣毛状細刺;雄蕊3;花柱长,柱头2。小坚果长圓形或倒卵状长圓形,較扁,长約为鱗片的1/2,棕色,具密的細点,頂端具很短的短尖。花果期5—8月。

产于广东、广西、海南島、云南;生长于山坡林下、沟边、田边近水处、曠野潮湿处。也分布于喜馬拉雅山区,印度、緬甸、泰国、越南、馬來亞、印度尼西亚、菲律宾、日本琉球羣島,澳洲以及美洲热带地区。

6. 冠鳞水蜈蚣 图版 LXI, 6

Kyllinga squamulata Thonn. ex Vahl, Enum. II (1806) 381; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 589 et Ill. Cyp. (1909) t. 1, f. 5—7; E.-G. Camus in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine VII (1912) 26, f. 3, 7 —— *Kyllinga squamulosa* Kunth, Enum. II (1837) 135, errore typ.; C. B. Clarke in Kew Bull. Add. Ser. VIII (1908) 93 —— *Cyperus metzii* (Hochst.) Mattf. et Kükenth. in Engl.

