

具极多数鳞片和小穗；鳞片倒披针形，頂端驟縮呈尾狀細尖；小穗具2片小鳞片和1朵两性花；小鳞片膜質，透明，具数条粗的脉，下面1片中空无花，上面1片內具1朵两性花；雄蕊2个，花药綫狀长圓形，长为花絲的1/3；花柱細长，露出于小鳞片外，柱头3个，被微柔毛。小坚果小，长圓狀倒卵形，三棱形，微弯，頂端具微小短尖，长约1毫米，麦稈黃色，具光泽，表面有細的皺紋。花果期6—10月。

本种分布很广，从东北至西南及台湾等省均产；生于水边和沼泽中，海拔400米左右。也分布于日本、越南、印度。

3. 細稈湖瓜草 图版 LXII, 9

Lipocarpa tenera Böckl., Cyper. Nov. I (1888) 21—*Lipocarpa atropurea* Böckl. l. c.

丛生矮小草本，无根狀茎。稈纤细，高10—18厘米，直径0.7—1毫米，扁，具槽，无毛。叶基生，叶片紙質，狭綫形，长约為稈的1/3，寬約1毫米，頂端鈍，中脉不明显，两面均无毛，邊緣稍內捲；鞘膜質，管狀，长1—1.5厘米，无叶舌。苞片叶狀，上端漸尖，頂端微鈍，邊緣內捲；穗狀花序2—3个簇生，罕1个单生，卵形，基部截形，长4—7毫米，寬約2.6毫米，具多数鳞片和 small 穗；鳞片倒披针形，黑紫色上端呈尾狀漸尖且外弯，短尖綠色，背面具龙骨狀突起，无毛；小穗具2片小鳞片和1朵两性花；小鳞片膜質，透明，具数条粗的脉，下面1片中空无花，上面1片具1朵两性花；雄蕊2，花絲与花药等长，花药长圓形；花柱短，与柱头等长，柱头3。小坚果披针狀卵形，平凸狀或近三棱形，頂端圓形具細尖，长约1毫米，成熟时黑紫色，表面有黑色、細而密的細点。花果期10—12月。

产于云南；生于水边，海拔約1850米。也分布于越南。

22. 野长蒲属——*Thoracostachyum* Kurz

Kurz in Journ. As. Soc. Beng. XXXVIII (1869) 75.

多年生粗壮草本，具根狀茎。稈直立，通常三棱形。叶基生和稈生，具柄或无柄而具鞘，具3条脉，上端漸狭，頂端三棱形，鞭狀漸尖，邊緣粗糙或具細鋸齒。苞片叶狀，远比花序为长；穗狀花序排列成頂生圓錐花序，橢圓形，具多数鳞片和 small 穗；小穗具6片小鳞片，有3朵雄花和1朵雌花，基部1对小鳞片位于两侧，对生，舟狀，各具1雄花，其余4片不为舟狀，綫形，透明，其中最下面1片具1雄花，上面3片內无花，雌花着生于小穗頂端；雄花只有1个雄蕊；雌花只有1个雌蕊；柱头3。小坚果圓筒狀，三棱形，頂端具喙。

