

具极多数鳞片和小穗；鳞片倒披针形，顶端骤缩呈尾状细尖；小穗具2片小鳞片和1朵两性花；小鳞片膜质，透明，具数条粗的脉，下面1片中空无花，上面1片内具1朵两性花；雄蕊2个，花药线状长圆形，长为花丝的1/3；花柱细长，露于小鳞片外，柱头3个，被微柔毛。小坚果小，长圆状倒卵形，三棱形，微弯，顶端具微小短尖，长约1毫米，麦秆黄色，具光泽，表面有细的皱纹。花果期6—10月。

本种分布很广，从东北至西南及台湾等省均产；生于水边和沼泽中，海拔400米左右。也分布于日本、越南、印度。

3. 细稈湖瓜草 图版 LXII, 9

Lipocarpha tenera Böcklr., Cyper. Nov. I (1888) 21—*Lipocarpha atropurpurea* Böcklr. l. c.

丛生矮小草本，无根状茎。稈纤细，高10—18厘米，直径0.7—1毫米，扁，具槽，无毛。叶基生，叶片纸质，狭线形，长约为稈的1/3，宽约1毫米，顶端钝，中脉不明显，两面均无毛，边缘稍内卷；鞘膜质，管状，长1—1.5厘米，无叶舌。苞片叶状，上端渐尖，顶端微钝，边缘内卷；穗状花序2—3个簇生，罕1个单生，卵形，基部截形，长4—7毫米，宽约2.6毫米，具多数鳞片和小穗；鳞片倒披针形，黑紫色，上端呈尾状渐尖且外弯，短尖绿色，背面具龙骨状突起，无毛；小穗具2片小鳞片和1朵两性花；小鳞片膜质，透明，具数条粗的脉，下面1片中空无花，上面1片具1朵两性花；雄蕊2，花丝与花药等长，花药长圆形；花柱短，与柱头等长，柱头3。小坚果披针状卵形，平凸状或近三棱形，顶端圆形具细尖，长约1毫米，成熟时黑紫色，表面有黑色、细而密的细点。花果期10—12月。

产于云南；生于水边，海拔约1850米。也分布于越南。

22. 野长蒲属—*Thoracostachyum* Kurz

Kurz in Jo urn. As. Soc. Beng. XXXVIII (1869) 75.

多年生粗壮草本，具根状茎。稈直立，通常三棱形。叶基生和稈生，具柄或无柄而具鞘，具3条脉，上端渐狭，顶端三棱形，鞭状渐尖，边缘粗糙或具细锯齿。苞片叶状，远比花序为长；穗状花序排列成顶生圆锥花序，椭圆形，具多数鳞片和小穗；小穗具6片小鳞片，有3朵雄花和1朵雌花，基部1对小鳞片位于两侧、对生，舟状，各具1雄花，其余4片不为舟状，线形，透明，其中最下面1片具1雄花，上面3片内无花，雌花着生于小穗顶端；雄花只有1个雄蕊；雌花只有1个雌蕊；柱头3。小坚果圆筒状，三棱形，顶端具喙。

全世界有 7 种，多数分布于亚洲东南部；我国产 1 种。

1. 露兜树叶野长蒲 野长蒲(云南) 图版 LXIII, 1—4

Thoracostachyum pandanophyllum (F. V. Muell.) Domin in Bibl. Bot. Heft 85, IV (1915) 484; H. Uittien in Rec. Trav. Bot. Néerland. XXXIII (1936) 138 —— *Hypolytrum pandanophyllum* F. V. Muell. Fragm. Phytogr. Austr. IX (1875) 16.

多年生高大草本，具根状茎。秆粗壮，挺直，高 100 多厘米，三稜形，无毛。叶基生和秆生，基生的具叶柄，秆生的具鞘，无毛，不具叶舌；叶片厚纸质，长约 200 多厘米，宽 2.4—3 厘米，基部略对折，上端渐狭，上部边缘粗糙，顶端三稜形，呈鞭状渐尖，具疏的细锯齿，有 3 条脉，中脉在叶背面隆起，两条侧脉在叶面上隆起，呈三折状，横切面呈“M”形，两面无毛。苞片叶状，最下面 1 片特别长，长可达 70 多厘米，宽 1.1—1.8 厘米，顶端呈鞭状，渐向上苞片逐渐减退，终呈鳞片状；圆锥花序呈繖房状，长约 5 厘米或较长，宽约 8 厘米；下部分枝平展，几垂直于花序轴上，具多数穗状花序；穗状花序单生或 3—5 个簇生，椭圆形，长 5—6 毫米，无柄，具多数鳞片和小穗；鳞片紧密地复瓦状排列，椭圆形或宽椭圆形，顶端钝圆，长 2.5 毫米，无毛，微有光泽，脉不明显；小穗两性，具 6 片小鳞片和 4 朵单性花；小鳞片膜质，透明，下面两侧 2 片为舟状，背面具龙骨状突起，沿龙骨状突起具长硬毛，各具 1 朵雄花，其余 4 片小鳞片不为舟状，其中下面 1 片内具 1 朵雄花，上面 3 片中空无花，最顶端为 1 朵雌花；雄花只具 1 个雄蕊，雌花只具 1 个雌蕊；花丝短，长约为花药的 1/4，花药线形或线状长圆形；柱头 3，长于花柱，微被疏柔毛。小坚果不详。花期约在 3 月间。

产于云南南部；生于疏林中潮湿处，海拔约 1100 米。也分布于马来亚、印度尼西亚、澳洲。

23. 擂鼓芳属 --- *Mapania* Aubl.

Aubl. Pl. Guion. I (1775) 47, t. 17.

多年生粗壮草本，通常具粗大、木质的匍匐根状茎。秆侧生，粗而短，三稜形。叶基生成丛，长而稍宽，坚韧，近革质，具 3 条脉。苞片叶状或鳞片状，长或短，革质或近

图版 LXII 1—8. 银穗湖瓜草 *Lipocarpha senegalensis* (Lam.) Dandy, 1. 植株的一部分 × 2/3; 2. 花序 × 2/3; 3. 穗状花序 × 7; 4. 鳞片 × 13; 5—6. 小鳞片 × 13; 7. 花 × 13; 8. 小坚果 × 13; 9. 细秆湖瓜草 *L. tenera* Böcklr., 花序 × 2/3。10. 华湖瓜草 *L. chinensis* (Osbeck) Tang et Wang, 花序 × 2/3。