

革質；穗狀花序少数或多数，聚生成头狀，少有1个单生，具多数鱗片和小穗；鱗片螺旋狀复瓦式紧密地排列；小穗两性，无柄，具5—6片小鱗片和3—4朵单性花：小鱗片輪生；下面一輪2—3片，其中2片位于兩側，舟狀，背面具龙骨狀突起，沿龙骨狀突起具长硬毛，各具1朵由1个雄蕊所构成的雄花，第3片小鱗片位于远軸的一面，平張而微凹，无龙骨狀突起，質薄，不育或具1朵雄花；上面的一輪3片，狹长圓形，質薄，透明，中空无花，頂端仅有1朵无小鱗片蔽护的雌花；花柱細长，宿存，柱头3，細长。小坚果干骨質或多汁，具喙或不具喙。

本属約有45种，分布于热带地区；我国产2种，产于广东、广西和海南島。

分种检索表

- 1(2) 穗狀花序4个，簇生，寬卵形，长1.8—2.4厘米。稈高25—54厘米……………1. 华播鼓芳 *M. sinensis* H. Uittien
2(1) 穗狀花序1个，单生，橢圓形或略帶倒卵形，长3厘米。稈高30—70厘米……………2. 长稈播鼓芳 *M. dolichopoda* Tang et Wang

1. 华播鼓芳 图版 LXIII, 10—13.

Mapania sinensis H. Uittien in Rev. Trav. Bot. Néerland. XXXIII (1936) 288

根狀茎木質，粗壯。稈生于叶丛外(側生)，高25—54厘米，直径3毫米，基部約具7个鱗片和鞘，自下而上鱗片逐大而成鞘。叶基生，兩行排列，帶形，向頂端漸狹而呈尾狀漸尖，长达130厘米或更长，寬2.5—3.5厘米，薄革質，光滑无毛，具3条脉，上部边缘和背面中脉上具細齿，粗糙，向基部对折而成鞘，鞘互相紧抱，边缘厚膜質，不閉合。苞片短于花序，卵形，頂端急尖，长1.5—2.5厘米，革質，具密槽，干时褐色；头狀花序由4个穗狀花序所組成，长3.5—4厘米；穗狀花序寬卵形，长1.8—2.4厘米，寬1.5—1.8厘米，具多数鱗片和小穗；鱗片螺旋狀复瓦式排列，厚紙質，狹长圓形，頂端鈍，长10毫米，麦稈黃色；小穗具6片小鱗片和4朵单性花，下面的3片小鱗片自成一輪，其中2片比球穗鱗片稍短，位于兩側，对生，舟狀，黃色，質稍薄，背部具龙骨狀突起，中部以上沿龙骨狀突起具細刺，各有1朵雄花，第3片小鱗片与里面(上面)的3片形状相似也具1朵雄花，里面的3片小鱗片狹长圓形，較舟狀小鱗片稍短，中空无花；每朵雄花具1个雄蕊；柱头3。小坚果近三棱形，倒卵形，长4—4.5毫米，頂端具圓錐狀喙，深褐色，无皺紋。 花果期10月。

产于广东和广西(瑤山，模式产地)：生长森林中，海拔650米。

2. 长稈播鼓芳 图版 LXIII, 5—9.

Mapania dolichopoda Tang et Wang, sp. nov. — *Mapania longa* Groff in Lingn. Agr. Rev. I (1923) 56; Merr. in Lingn. Sci. Journ. V (1927) 40, non Ridley

