

个雄蕊,突出于小鳞片外,花药狭长圆形,长1毫米,药隔不突出;雌花子房具狭稜,柱头2。小坚果圆卵形,双凸状,两面强烈凸起,顶端具圆锥状喙,长2—2.5毫米,褐色,具少数稍不规则而隆起的纵皱纹。花果期4—8月。

产于广东、广西、台湾、云南;生长在林中湿地或灌木丛中。分布于印度、泰国(二地为模式产地)、锡金、锡兰、缅甸和越南。

2. 台湾割鸡芒

Hypolytrum formosanum Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 168 — *Hypolytrum latifolium* Matsum. Ind. Pl. Jap. II, 2 (1905) 153, non L. C. Rich.

根据 Ohwi 记载,本种特点为穗状花序少,约10个,排列成繖房花序;苞片2片,下面1片线状披针形,长4—5厘米,宽5毫米。叶宽7—10毫米。

产于我国台湾,著者尚未有见到该种标本。

3. 少穗割鸡芒

Hypolytrum paucistrobiliferum Tang et Wang, sp. nov.

匍匐根状茎木质,具少数粗而硬的须根。植株分营养苗和花苗;营养苗具基生叶,叶2列排列,线形,向顶端渐狭,长55—105厘米,宽1.5—2.0厘米,平张,向基部对摺渐成叶鞘,厚纸质,无毛,平滑,稍呈苍白色,边缘和背面中脉在近顶端部分具细锯齿而粗糙,鞘长10—18厘米,不闭合,边缘狭而为厚膜质,平滑,无毛,无叶舌;花苗具秆,秆高5—10厘米,基部具鞘,鞘以下为紫色鳞片。苞片3片,最下的一片具闭合的鞘,距离花序稍远,与花序等长;穗状花序少数,具多数鳞片和小穗;小穗两性,长约2毫米,具2片小鳞片和3朵单性花;鳞片舟状,位于两侧,对生,膜质透明,在远轴的一面分离,在近轴的一面合生,背部具龙骨状突起,沿龙骨状突起具短硬毛,内各有1朵雄花,雄花之上为1朵雌花;雄花具1个雄蕊,药线形,药隔微突出;柱头2,长于花柱。小坚果近球形,直径约2毫米,具二稜,腹背各面具3—5条稍不规则的纵皱纹,橄欖色,顶端具短尖,基部具短柄。花果期不詳。

产于广东海南岛(模式产地)。

4. 海南割鸡芒 图版 LXIV, 4—6.

图版 LXIII 1—4. 露兜树叶野长蒲 *Thoracostachyum pandanophyllum* (F. V. Muell.) Domin, 1. 花序 × 1; 2. 穗状花序 × 10; 3. 小穗(展开) × 10; 4. 小穗图式。 5—9. 长程播鼓芳 *Mupania dolichopoda* Tang et Wang, 5. 花序 × 1; 6. 小穗(未展开) × 4; 7. 小穗(展开) × 4; 8. 小坚果 × 4; 9. 小穗图式。 10—13. 华播鼓芳 *M. sinensis* H. Uittien, 10. 花序 × 1; 11. 小穗(展开) × 4; 12. 小坚果 × 4; 13. 小穗图式。