

个雄蕊,突出于小鳞片外,花药狭长圆形,长1毫米,药隔不突出;雌花子房具狭稜,柱头2。小坚果圆卵形,双凸状,两面强烈凸起,顶端具圆锥状喙,长2—2.5毫米,褐色,具少数稍不规则而隆起的纵皱纹。花果期4—8月。

产于广东、广西、台湾、云南;生长在林中湿地或灌木丛中。分布于印度、泰国(二地为模式产地)、锡金、锡兰、缅甸和越南。

2. 台湾割鸡芒

Hypolytrum formosanum Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 168 — *Hypolytrum latifolium* Matsum. Ind. Pl. Jap. II, 2 (1905) 153, non L. C. Rich.

根据 Ohwi 记载,本种特点为穗状花序少,约10个,排列成繖房花序;苞片2片,下面1片线状披针形,长4—5厘米,宽5毫米。叶宽7—10毫米。

产于我国台湾,著者尚未有见到该种标本。

3. 少穗割鸡芒

Hypolytrum paucistrobiliferum Tang et Wang, sp. nov.

匍匐根状茎木质,具少数粗而硬的须根。植株分营养苗和花苗;营养苗具基生叶,叶2列排列,线形,向顶端渐狭,长55—105厘米,宽1.5—2.0厘米,平张,向基部对摺渐成叶鞘,厚纸质,无毛,平滑,稍呈苍白色,边缘和背面中脉在近顶端部分具细锯齿而粗糙,鞘长10—18厘米,不闭合,边缘狭而为厚膜质,平滑,无毛,无叶舌;花苗具秆,秆高5—10厘米,基部具鞘,鞘以下为紫色鳞片。苞片3片,最下的一片具闭合的鞘,距离花序稍远,与花序等长;穗状花序少数,具多数鳞片和小穗;小穗两性,长约2毫米,具2片小鳞片和3朵单性花;鳞片舟状,位于两侧,对生,膜质透明,在远轴的一面分离,在近轴的一面合生,背部具龙骨状突起,沿龙骨状突起具短硬毛,内各有1朵雄花,雄花之上为1朵雌花;雄花具1个雄蕊,药线形,药隔微突出;柱头2,长于花柱。小坚果近球形,直径约2毫米,具二稜,腹背各面具3—5条稍不规则的纵皱纹,橄欖色,顶端具短尖,基部具短柄。花果期不詳。

产于广东海南岛(模式产地)。

4. 海南割鸡芒 图版 LXIV, 4—6.

图版 LXIII 1—4. 露兜树叶野长蒲 *Thoracostachyum pandanophyllum* (F. V. Muell.) Domin, 1. 花序 × 1; 2. 穗状花序 × 10; 3. 小穗(展开) × 10; 4. 小穗图式。 5—9. 长程播鼓芳 *Mupania dolichopoda* Tang et Wang, 5. 花序 × 1; 6. 小穗(未展开) × 4; 7. 小穗(展开) × 4; 8. 小坚果 × 4; 9. 小穗图式。 10—13. 华播鼓芳 *M. sinensis* H. Uittien, 10. 花序 × 1; 11. 小穗(展开) × 4; 12. 小坚果 × 4; 13. 小穗图式。

Hypolytrum hainanense (Merr.) Tang et. Wang, comb. nov.——*Mapania hainanensis* Merr. in Lingn. Sci. Journ. IX (1903) 35——*Hypolytrum latifolium* Chunet How in Act. Phytotax. Sin. VII (1958) 87, non L. C. Rich. (1805).

根状茎木質，具較坚硬而粗壯的須根。植株分营养苗和花苗；营养苗具基生叶，叶綫形，向頂端漸狹，長約1米，寬10—18毫米，厚紙質，无毛，邊緣和背面中脉上具細鋸齒，因而粗糙，平張，仅向基部稍对折而成叶鞘；叶鞘高达14厘米，不閉合，微紅色，邊緣厚膜質，平滑无毛，稍有光泽；花苗具稈，稈三棱形，高30—40厘米，基部具少数叶鞘，鞘以下为排列緊密的深褐色鱗片；叶鞘对折，近革質，邊緣厚膜質。苞片叶状，2—3枚，稍長于花序，只最下的一片明显具鞘；穗状花序密聚成头状，头状花序長13—20毫米，寬15—23毫米，穗状花序長橢圓形，長6毫米，寬3毫米，至結果实时圓球形，直径約6毫米，具多数鱗片和小穗；鱗片螺旋状复瓦式排列，長圓状倒卵形，頂端鈍圓，長2.5—3毫米，坚硬，黃褐色而有褐色細点，背脊稍具龙骨状突起，邊緣白膜質，內具一个小穗；小穗两性，具2片小鱗片和3朵单性花；小鱗片对生，狹橢圓形，舟形，長2.5毫米，內各具一朵雄花，褐色，膜質，背脊具龙骨状突起，沿龙骨状突起具細刺，在近軸的一面合生，在远軸的一面离生；雄花具一个雄蕊，稍高出小鱗片，药狹長圓形，長1.5毫米，药隔不突出；雌蕊裸露，子房狹梭状，柱头2。小坚果寬倒卵形或卵形，頂端具圓錐状喙，長3毫米，双凸状而有強烈凸起的两面，褐色，具微不規則的、隆起的縱皺紋。花果期5—8月。

仅产于广东海南島(儋县水尾山；临高县蓮花山)；生于山上干燥的地方。

25. 石龙乌属——*Lepironia* L. C. Rich.

L. C. Rich. in Pers. Synops. I (1805) 70.

多年生草本，具木質匍匐根状茎。稈高，直立，成列密生，圓柱状，有如灯心草稈，中具橫隔膜，干时稈呈多节状，基部具鞘。叶缺如。苞片为稈的延長，直立，圓柱状鉗形；穗状花序单一，假側生，具多数鱗片和小穗；鱗片螺旋状复瓦式排列；小穗两性，具2片舟形小鱗片和多数綫形小鱗片，有8朵或更多雄花和1朵雌花；舟形小鱗片位于兩側，对生，背部具龙骨状突起，沿龙骨状突起具柔毛，各具1朵雄花，其他小鱗片成多輪而密生，狹長，平張或近平張，具雄花或不具雄花，雄花在下面，雌花頂生；花柱稍短，柱头2，細長。小坚果扁，无喙，亦无皺紋。

本属只有1种，分布于亚洲热带地区；我国亦产。

1. 光果石龙乌

