

或有短叶片,在秆中部以上的具狭翅,被长柔毛,尤以近叶舌处为密;叶舌半圆形,顶端钝圆。苞片叶状,具鞘,鞘口密被褐色微柔毛;小苞片刚毛状,与小穗等长或稍长;圆锥花序由2—4个顶生和侧生枝花序所组成,支花序互相远离,长1.2—3厘米,具少数小穗,支花序柄长短不一,长0.5—5.5毫米,上部通常具狭翅,被微柔毛;小穗披针形,长4—5毫米,多数为单性;雌小穗具4—5片鳞片和1朵雌花,雄小穗具7—9片或更多;鳞片卵形至披针形,深麦秆黄色或褐色而微带紫,顶端急尖,具短尖,背面具龙骨状突起;雄花具雄蕊2—3个,花丝长短各花不一;子房近圆形,无毛,花柱不詳。小坚果近球形或倒卵状圆球形,顶端具白色短尖,长2.75—3毫米,直径1.75—2毫米,无毛,表面具方格纹;下位盘黄白色,3浅裂,裂片卵状三角形或近圆形,长为小坚果的1/3—1/4,顶端急尖,边缘反折。花果期7—10月。

产于浙江、福建、湖南、广东、贵州、云南;生长于山坡路旁、荒地、稻田及山沟中,海拔0—2700米。也分布于印度、锡兰、尼泊尔、越南、老挝、马来亚、日本、朝鲜及澳洲。

7. 垂序珍珠茅 图版 LXVII, 6

Scleria onoei Franch. et Savat. Enum. Pl. Jap. II (1879) 122 et 549; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 9.

var. *onoei*

无根状茎,具须根。秆丛生,直立,三稜形,高10—25厘米,无毛。叶秆生,线形,向顶端渐狭,顶端钝,宽2—4毫米,纸质,边缘粗糙,两面被疏微柔毛;叶鞘几无翅,被微柔毛,鞘口具短叶舌;叶舌半圆形,边缘被长柔毛状缘毛。苞片叶状,具鞘,鞘口被微柔毛状缘毛,小苞片较短小,无鞘;圆锥花序由3—5个顶生和侧生枝花序所组成,支花序长7—15毫米,互相远离,具少数小穗,支花序柄长短不一,长0.4—4厘米,通常具翅;小穗单生或2个生在一起,披针形或卵状披针形,长2—4毫米,多数为单性;雌小穗具3—5片鳞片和1朵雌花;雄小穗不詳;子房倒卵形,平滑,无毛。小坚果球形或近球形,顶部几圆形,顶端微尖,直径1.5毫米,白色或灰白色,平滑,有光泽,具3条褐色纵条纹和不规则的纵横皱纹,顶部以下由于纵横皱纹粗而隆起,使表面形成许多小穴;下位盘长为小坚果的1/3—1/4,3裂,裂片半圆形或半椭圆形,顶端圆形,边缘反折,厚。花果期约8月。

产于广东及台湾;也分布于朝鲜及日本。

毛垂序珍珠茅(变种)

var. *pubigera* Ohwi, Fl. Austro-Higoensis (1931) 84 et Cyper. Jap. II (1944)

