

稍小于小坚果,或多或少3裂,裂片半圆状三角形,顶端钝圆,边缘反折,淡黄色。花果期5—7月。

产于福建、湖南、湖北、贵州、四川、云南、广东、广西;生长在无蔭山坡、山沟、山脊灌木丛或草丛中,海拔450—2000米。也分布于东喜马拉雅山地区,越南。

9. 华珍珠茅 图版 LXIX, 7—8

Scleria chinensis Kunth, Enum. II (1837) 357; Benth. Fl. Hongk. (1861) 400; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 263 — *Scleria ciliaris* Nees in Wight, Contrib. (1834) 117, non Michx.

根状茎木质,被紫色或紫褐色鳞片。秆疏丛生,粗壮,三棱形,高70—120厘米,直径约5毫米,无毛,稍粗糙。叶线形,向顶端渐狭或急尖,末端有时呈尾状,长15—35厘米,宽6—9毫米,纸质,无毛,稍粗糙;叶鞘纸质,长1—10厘米,无毛,在近秆基部的鞘褐色或紫褐色,无翅,鞘口具约3个大小不等的卵状披针形齿,在秆中部以上的鞘绿色,具1—3毫米宽的翅;叶舌为舌状,长4—12毫米,无毛,褐色或黄褐色,两侧与顶部有时呈紫色。圆锥花序由顶生和1—3个相距稍远的侧生枝圆锥花序组成;支圆锥花序长6—10厘米,宽2—6厘米,分枝斜立,稍密集,花序轴有时被疏柔毛;小苞片刚毛状,基部通常有耳,耳上具长硬毛;小穗通常2—4个聚生,很少单生,长约4毫米,褐色或紫色,大部为单性;雄小穗长圆状卵形,顶端截形;鳞片膜质,长3—4毫米,有时具缘毛,在下部的几片具龙骨状突起,顶端具芒或短尖,在上部的质较薄,色亦较浅;雌小穗通常生于分枝的基部,披针形,顶端渐尖;鳞片宽卵形或卵状披针形,具龙骨状突起,顶端亦具芒或短尖;雄花具3个雄蕊,花药线形,长2毫米,药隔突出部分长约为药的1/4;子房被短柔毛,柱头3。小坚果近球形,略呈钝三棱形,直径2.5毫米,白色,表面具四至六角形网纹,横纹上被微硬毛;下位盘直径1.6—2毫米,3裂,裂片近半圆形,顶端钝圆,边缘反折,黄色,大都具密的锈色条纹。花果期12月至次年4月。

产于广东、海南岛;生长在山沟、林中、旷野草地、山顶等,海拔350—850米。也分布于马来亚、越南,澳洲热带地区。

10. 高秆珍珠茅

Scleria elata Thw. Enum. Pl. Zeyl. (1864) 353 (Twaites n. 825 excl.); C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 264 — *Scleria doederleiniana* Böckl. in Engl. Bot. Jahrb. V (1884) 512; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 5.

var. *elata*

