

約2毫米,白色,表面具隆起的橫皺紋,略呈波狀,其上或多或少被微硬毛;下位盤略較小堅果窄,3深裂,裂片披針狀三角形,少有卵狀三角形,頂端急尖或具2—3個小齒,邊緣反折,淡黃色。 花果期6—10月。

產于浙江、湖南、貴州、四川、雲南、廣西、廣東、海南島、福建、台灣;生長在乾燥處、山坡草地、密林下、潮濕灌木叢中,海拔0—1500米。也分布于印度、錫蘭、馬來亞、越南、日本、印度尼西亞和澳洲。

### 柔毛果珍珠茅(變種)

var. *pubescens* (Steud.) C. B. Clarke in Fl. Brit. Ind. VI (1894) 689.  
——*S. pubescens* Steud. Syn. pl. Cyp. (1855) 168.

本變種主要特征是植株各部被短柔毛。模式標本采自香港。

產于湖南、江西、雲南、福建、廣東。

### 12. 細根莖珍珠茅 圖版 LXVIII, 1—2

*Scleria psilorrhiza* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1894) 691.

根狀莖較細,直徑約3毫米,被褐色鱗片。稈三稜形,高達1米以上,直徑約4毫米,無毛,稍粗糙。葉綫形,向頂端漸狹,頂端鈍或急尖,有時多少呈尾狀,長約30厘米,寬5—15毫米,紙質,無毛,稍粗糙;葉鞘長1—15厘米,在近稈基部的幾個鞘膜質或紙質,褐色,無翅,具約3個大小不等的三角形齒,在稈中部以上的鞘紙質,綠黃色,具2—5毫米寬的翅;葉舌為舌狀,黃褐色,無毛或被疏微柔毛。圓錐花序由頂生和1個相距稍遠的側生枝花序組成;支花序由于分枝短或無,多少呈穗狀,頂生的長6—8厘米,寬約1.5厘米,約具20—30個小穗,側生的較小,約具4—15個小穗;小苞片剛毛狀,基部較寬,兩側具短柔毛;小穗通常2—3個聚生,或為單生,長3.5毫米,無柄,銹褐色,全部單性;雄小穗橢圓形或長圓形,頂端斜截形或鈍圓,常具3—5條高出頂端的硬芒;鱗片厚膜質,長2—3毫米,褐色而帶銹斑,有時或多或少被糙伏毛,具或不具緣毛,在下部的幾片鱗片具龍骨狀突起,頂端有長1—4毫米的粗芒,在上部的質較薄,具幾條不很明顯的脈;雌小穗通常生于分枝的基部,橢圓形或卵狀披針形;鱗片寬卵狀披針形或寬卵形,略具龍骨狀突起,有時腹面被糙伏毛,亦具長芒;雄花具3個雄蕊,花藥綫形,長1.5毫米,藥隔突出部分長約為花藥的1/3;柱頭3。小堅果卵珠形,鈍三稜形,頂端的短尖几不顯著,直徑3毫米,白色或淡褐色,平滑,無毛,有光澤;下位盤為鈍三角形,直徑約2.5毫米,3淺裂,裂片短而近半圓形,頂端鈍圓,邊緣反折,淺棕色。 花果期7月。

產于雲南;生長在無蔭山坡上,海拔200米。也分布于柬埔寨。

