

三角形、披针形或宽卵形，长 1.5—2.5 毫米，厚膜质，色亦较深，多少具龙骨状突起，常被稀疏的糙伏毛，具短尖；雄花具 3 个雄蕊，花药线形，长约 1 毫米，药隔突出部分长约 1/3；柱头 3。小坚果卵形，钝三棱形，顶端具短尖，长 2.5 毫米，直径 2 毫米，白色，平滑无毛，光亮；下位盘直径约 1.5 毫米，3 裂，裂片三角状半圆形，边缘反折，金黄色。 花果期 4—8 月。

产于广东、海南岛、广西、云南；生长在山谷、溪边、密林中或丘陵潮湿处，海拔 140—650 米。

15. 圆稈珍珠茅 图版 LXIX, 4—6

Scleria harlandii Hance in Ann. Sci. Nat. Sér. 5, V (1866) 248; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 264—*Scleria purpurascens* Benth. Fl. Hongk. (1861) 400.

植株粗壮。秆近圆柱状，有时略呈钝三棱形，高可达 1 米以上，直径约 6 毫米，无毛，有光泽。叶线形，向顶端渐狭，顶端呈尾状，长约 30 厘米，宽 6—8 毫米，薄革质，无毛，稍粗糙；叶鞘紧抱秆，长 4—6 厘米，薄革质，金黄色而多少具紫色条纹，有时被长柔毛，无翅，在近秆上部的鞘常互相重迭；叶舌半圆形，紫色，具长约 1 毫米的缘毛。圆锥花序由顶生和 7—8 个相距稍远的侧生枝圆锥花序组成，全长可达 40 厘米，支圆锥花序呈金字塔状，长约 5 厘米，花序轴常被微柔毛；小苞片刚毛状，几与小穗等长，基部有耳，耳上具髯毛；小穗单生或 2 个生在一起，长 3—4 毫米，浅锈色或紫色，大部分单性；雄小穗长圆状卵形或披针形，顶端截形或急尖；鳞片膜质，长 1.35—3 毫米，具锈色条纹，有时上端被疏柔毛，在下部的几片鳞片具龙骨状突起，通常具短尖，在上部的色浅而质薄；雌小穗通常生于分枝的基部，披针形，顶端渐尖；鳞片宽卵形或卵状披针形，多少具龙骨状突起，顶端具短尖，上端具缘毛；雄花具 3 个雄蕊，花药线形，长约 1 毫米，药隔突出部分长约 1/4—1/3；柱头 3。小坚果近球形，钝三棱形，顶端具短尖，直径约 2.5 毫米，白色，平滑，光亮，仅顶部被稀疏的微硬毛；下位盘直径略较小坚果小，3 裂，裂片三角形，顶端急尖或渐尖，或有 2—3 个齿，边缘反折，金黄色，具浅锈色条纹。 花果期 3—9 月。

产于广东、海南岛；生长在山坡、山沟或山旁的疏林或密林中。

16. 印尼珍珠茅

图版 LXVIII 1—2. 细根茎珍珠茅 *Scleria psilorrhiza* C. B. Clarke, 1. 花序 × 1; 2. 小坚果 × 10。 3—4. 稻形珍珠茅 *S. oryzoides* Presl, 3. 花序 × 1; 4. 小坚果 × 10。 5—6. 毛果珍珠茅 *S. herbearpa* Nees, 5. 花序 × 1; 6. 小坚果 × 10。

