

色；花柱基部增粗，柱头 3 个。 花果期 4—6 月。

产于广西；生于山谷阴处灌丛中。模式标本采自广西融水县大苗山。

30. 少穗薹草

Carex oligostachya Nees ex Hook. in Kew Journ. 6:29, 1854; Nelmes in Reinwardtia 1:244, 1951 et in Mém. Mus. National Hist. Nat. Nlle Sér. B. Bot. 4(2):95, 1955; Raymond in Mém. Jard. Bot. Montréal no. 53:22, 1959, Kern et Noot. in Steenis, Fl. Males. 1, 9(1):144, fig. 120, 1979. — *Carex rhizomata* Steud., Syn. Pl. Cyper. 1:206, 1855; Kükenth. in Engl., Pflanzenr. Heft 38 (IV. 20): 289. 1909.

根状茎匍匐，木质。秆侧生，高 20—80 厘米，粗 1—2 毫米，三棱形，光滑，基部具褐色的叶鞘。叶基生和秆生；基生叶短于秆，数枚一束，形成一较高的分蘖枝，叶片禾叶状，平张，宽 2—5 毫米，基部为褐色的宿存叶鞘所包；秆生叶呈佛焰苞状，褐色。苞片与秆生叶近同型，但顶端具线形的苞叶，短于支花序。圆锥花序复出，具 6—12 个疏生的支花序；支花序近伞房状，单生或双生，具 3—5 个小穗；支花序柄纤细，直立，稍粗糙；支花序轴棱上疏被短粗毛；小苞片鳞片状，长约 3 毫米。小穗开展，两性，雄雌顺序，长 4—10 毫米；雄花部分长于雌花部分或二者近等长。雄花鳞片披针形，长 3—3.5 毫米，褐色，无毛；雌花鳞片卵形，至卵状披针形，长 2—3 毫米，顶端钝，有短尖，淡褐色，密生紫红色斑点和短线，上部疏被短粗毛，有白色膜质边缘。果囊开展，长圆形，稍肿胀三棱形，长 2.5—4 毫米，褐绿色至紫褐色，具数条隆起的脉，疏被短粗毛，上部急缩为中等长的喙，喙长仅为果囊的 1/3，喙口具明显 2 齿。小坚果椭圆形，三棱形，长 2—2.3 毫米；花柱基部不增粗，柱头 3 个。

产于广西、贵州；生于山坡草地，海拔 900—1 200 米。印度、缅甸、越南北部、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、巴布亚新几内亚也有分布。模式标本采自菲律宾。

31. 三念薹草 三念草（增城）

Carex tsiangii Wang et Tang in Contrib. Inst. Bot. Nat. Acad. Peiping 6(2):59, 1949. — *Carex surculosa* Raymond in Mem. Jard. Bot. Montréal no. 53:22, fig. 4, 1957.

根状茎木质，具匍匐枝。秆丛生，侧生，高 40—60 厘米，粗约 1 毫米，三棱形，光滑，基部具褐色的叶鞘。叶基生和秆生；基生叶长于秆，数枚一束，形成一较高的分蘖枝；叶片禾叶状，平张，宽 5—7 毫米，两面光滑，边缘全缘或粗糙，基部为褐色的宿存叶鞘所包；秆生叶退化呈佛焰苞状，褐色，初时疏被短柔毛，后变光滑。苞片佛焰苞状，与秆生叶近同型，但顶端具线形苞叶，短于支花序。圆锥花序复出，长 6—10 厘米，具 3—6 个支花序；支花序近伞房状，轮廓为宽卵形，长约 2 厘米，宽 2—3 厘米，单生或双生，具 3—10 个小穗；支花序柄柔弱，长 3—5.5 厘米，微粗糙；支花序轴锐三棱形，初时密被短粗毛，后变光滑；小苞片鳞片状，披针形，长 2.5—3 毫米，中间淡绿色，有褐色斑点，两侧褐色，疏被短柔毛。小穗斜展至横展，长 10—15 毫米，两