

44. 暗色薹草

Carex obscura Nees in Wight, Contrib. Bot. Ind. 126, 1834.

产尼泊尔, 海拔 3 000—4 300 米。

44a. 暗色薹草 (原变种)

var. *obscura*

44b. 刺囊薹草 (变种) (横断山区维管植物) 图版 20: 9—12

Carex obscura Nees var. *brachycarpa* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 6: 731, 1894; Kükenth. in Engl., Pflanzenr. Heft 38 (IV. 20): 388, 1909; T. Koyama in Hara et al., Enum. Flow. Pl. Nepal 1: 104, 1978; 横断山区维管植物 下册: 2374, 1994. — *C. souliei* Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris 8 sér 7: 35, 1895; 中国高等植物图鉴 5: 294, 图 7414, 1976; 西藏植物志 5: 429, fig. 249, 1987. — *C. obscura* auct. non Nees: Kükenth. in Engl., Pflanzenr. Heft 38 (IV. 20): 388, 1909. pro parte quoad specim. Kiala (Soulie no. 412, 958).

根状茎短, 少有斜生。秆丛生, 高 15—80 厘米, 锐三棱形, 下部平滑, 上部粗糙, 基部叶鞘紫红色。叶短于秆, 宽 2—5 毫米, 平张, 边缘粗糙, 顶端长渐尖。苞片叶状, 最下部的 1—2 枚长于花序, 无鞘。小穗 3—6 个, 顶生 1 个雌雄顺序, 长圆形, 长 1—1.5 厘米; 侧生小穗雌性, 长圆形, 长 8—12 毫米; 小穗柄短或近无柄。雌花鳞片卵形或宽卵形, 顶端稍尖或钝, 长 1.8—2 毫米, 暗紫红色。果囊长于鳞片, 倒卵状椭圆形或宽椭圆形, 三棱形, 长 2—2.5 毫米, 淡绿色, 无明显的脉, 上部边缘生小刺, 顶端骤缩成极短的喙, 喙口微凹。小坚果倒卵形或倒卵状椭圆形, 三棱形, 栗色, 长 1.5—2 毫米; 花柱短, 柱头 3 个。 花果期 7—8 月。

产四川西部、云南西北部、西藏东南部; 生于高山针叶林下阴湿处、浅水中或草甸, 海拔 2 700—4 100 米, 分布喜马拉雅山 (克什米尔至锡金)。模式标本采自喜马拉雅山。

45. 长芒薹草 (东北草本植物志)

Carex gmelinii Hook. et Arn. Bot. Beech. 3: 118, t. 27, 1832; Franch. in Neuv. Arch. Mus. Paris III, 9: 151, 1897; Meinsh. in Acta Hort. Petrop. 18: 345, 1901; Kom., Fl. Mansh. 1: 369, 1901; Kükenth. in Engl., Pflanzenr. Heft 38 (IV. 20): 396, fig. 62, A—C, 1909; V. Krecz. in Kom., Fl. URSS 3: 277, 1935; Ohwi, Cyper. Japon. 1: 318, 1936; Kitag., Lineam. Fl. Mansh. 102, 1939; Mackenzie, North Amer. Caric. 2: pl. 422, 1940; Akiyama, Caric. Fac East. Reg. Asia 3, pl. 93, 1955; 东北草本植物志 11: 147, 1976;

根状茎斜升, 具匍匐茎。秆密丛生, 高 20—60 厘米, 上部稍粗糙, 基部叶鞘无叶片, 暗紫红色, 分裂成网状。叶短于秆, 宽 3—7 毫米, 稍硬。苞片叶状, 近无鞘。小