

根状茎短。秆丛生，高 25—60 厘米，三棱形，纤细，平滑，基部具紫褐色叶鞘。叶短于秆，宽 2—3 毫米，柔软。苞片刚毛状，无鞘。小穗 2—3 个，接近，顶生 1 个雌雄顺序，卵形或长圆形，长 8—10 毫米；侧生小穗雌性，卵形或长圆形，长 5—10 毫米；小穗柄纤细，最下部的柄长 5—12 毫米，上部的具短柄。雌花鳞片卵形或卵状披针形，顶端尖或钝，长 2—2.2 毫米，暗紫红色，具狭的白色膜质边缘，背面具 3 条脉。果囊长于鳞片，倒披针形或窄椭圆状披针形，三棱形，长 3—3.5 毫米，宽约 1 毫米，不膨胀，黄绿色或淡褐色，脉明显，顶端急缩成短喙，喙长 0.5 毫米，喙口暗紫色，口具明显 2 齿。小坚果长圆形，三棱形，长约 2 毫米；花柱长，基部不增粗，柱头 3 个。花果期 7—8 月。

产河北、山西、甘肃、青海；生于林下或潮湿处。

57. 高加索薹草

Carex caucasica Stev. in Mém. Soc. Nat. Moscou 4:68, 1813.

产俄罗斯（高加索、乌拉尔）和帕米尔。

57a. 高加索薹草（原亚种）

subsp. *caucasica*

57b. 扁果薹草（亚种） 大井扁果薹（台湾植物志）

subsp. *jisaburo-ohwiana* (T. Koyama) T. Koyama in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. III. 8(4):197. 1962; 台湾植物志 5:361, 1978. — *C. jisaburo-ohwiana* T. Koyama in Japan Journ. Bot. 15:176, fig. 7, A—C, 1956. — *C. duthiei* sensu Ohwi in Japan Journ. Bot. 7:194, 1934 & in Mem. Coll. Sci. Kyoto Univ. B. 11:316, 1936.

根状茎短。秆高 25—60 厘米，三棱形，下部平滑，上部粗糙，基部叶鞘红紫色或褐紫色，稍分裂成纤维状。叶短于秆，宽 3—5 毫米，线形，平张，柔软，稍平滑。苞片最下部的叶状，稍超过花序，其余的刚毛状，具鞘。小穗 3—6 个，除最下部的 1 个外均接近，近等高，顶生小穗雌雄顺序；侧生小穗雌性，长圆状椭圆形或长圆形，长 1—3 厘米，宽 3—6 毫米，密花；上部小穗无柄，最下部 1—2 个具长柄，下垂。雌花鳞片披针状椭圆形，顶端急尖，长 3.2—3.8 毫米，膜质，暗紫褐色或紫黑色，具 3 条脉，黄色，延伸成短尖头。果囊长于鳞片，倒卵形或倒卵状椭圆形，长 3—3.5(3.8)毫米，宽 1.7—1.9 毫米，膜质，黄绿色，上部稍紫色，突然狭窄成直立的短喙，喙口近截形。小坚果疏松地包于果囊中，倒卵形，三棱形；柱头 3 个。

产我国台湾；生高山草地。模式标本采自台湾。

组 12. 米柱薹草组 Sect. 12. *Glaucaeformes* Ohwi, Cyper. Japon. 1:413, 1936; 东北草本植物志 11:106, 1976.